

9.8x14cm

衛署藥製字第031008號
Code No. 31305

“溫士頓”

視可定

眼用懸浮液

Zenicortine Ophthalmic suspension "Winston"

本品為眼用的滅菌懸浮液，含抗發炎作用的Hydrocortisone acetate及抗菌劑Neomycin sulfate。

【成分】

本品每 ml 含：

Neomycin (as sulfate).....3.5 mg(potency)
Hydrocortisone acetate.....10 mg

賦形劑：Benzalkonium Chloride、Sodium Citrate Dihydrate、Hydroxypropyl methylcellulose 2910、Sodium Chloride、Sodium Phosphate Monobasic Dihydrate、Sodium Phosphate Dibasic 12H₂O、Water For Injection

【作用】

- 1.Hydrocortisone acetate為腎皮質分泌的Glucocorticoid具Corticosteroid性質，可直接作用於患部的毛細血管，而使患部炎症現象消除，亦具有抗Allergic作用。
- 2.Neomycin sulfate為1949年Waksman由Streptomyces fradiace分離出的Neomycin衍生物，是一種廣效性的氨基糖苷(Aminoglycoside)類抗生素，對革蘭氏陰性、陽性菌及耐酸性細菌均有效，其作用機轉乃是作用於細菌細胞膜抑制蛋白質合成，而具殺菌作用。

【適應症】

眼部感染及發炎症狀，特別是微生物引起的結合膜炎、過敏性結膜炎感染、角膜結合膜炎、葡萄膜炎、鞏膜炎和上鞏膜炎、眼瞼炎。

【禁忌】

- 1.黴菌性或孢疹性角膜炎。
- 2.對Neomycin有過敏性者。
- 3.青光眼。

【副作用】

在長期使用時可使眼內壓上升而導致青光眼，類固醇會抑制人體防禦系統反應而引發再度感染或使治療期延長。Neomycin會因長期使用而生過敏性。

【注意事項】

- 1.如有上述副作用產生時，應當停止使用。
- 2.本品應謹慎使用，如有任何反應發生時，應立即停用。
- 3.使用前請詳閱本說明書。

【用法用量】

- 1.本藥為懸浮劑，故用前須振搖。
- 2.感染時，每次滴2~3滴，一天滴3次，持續2個星期，病情較嚴重時，可每小時或每2小時滴一次，每次滴2~3滴。
- 3.本藥須由醫師處方使用。

【包裝】

3~100 ml/Bot.於低溫避光貯存。

1504-01



溫士頓醫藥股份有限公司

Made in Taiwan

臺南市永康區鹽洲里仁愛街117號