

# "仁興" 適利平 錠

## "DCPC" Triazide Tablets

衛署藥製字第031310號 GMP G-1239

本品可有效的降低血壓，且減少一般Thiazide利尿劑造成鉀離子流失。可與 $\beta$ -阻斷劑合用加強其降壓效果。

「成份」每錠含

Hydrochlorothiazide	25mg
Triamterene	50mg

「藥理作用」：

1. Hydrochlorothiazide可增加鈉離子通過遠端腎小管的量，阻止鈉鹽再吸收。並且可增加水份排泄的體積。
2. Triamterene在遠側腎小管發揮作用，可阻止鈉鉀離子的交換作用，能保存鉀離子和氫離子，又能促進鈉離子排泄尿中。此作用不受Aldosterone存在與否的影響。由於Triamterene具有保鉀作用，所以本品可減少一般利尿劑低血鉀症之危險性。因此本品特別用於避免低血鉀症之發生及其所引起副作用之患者，用本品可除去鉀鹽補充之需。

使用本品沒像單獨使用

Hydrochlorothiazide會發生血氣過少鹼性中毒報告。

「禁忌」：

下列患者禁止使用本品

1. 腎臟機能不良者，包括尿少或無尿者及氮血症患者。
2. 肝機能障礙的病者，或對二個成份分別有過敏現象者。
3. 患者之血漿中已存在有能提高鉀鹽因素者不可使用。

「副作用」：

本品之副作用一般很少，包括肌肉痙攣、虛弱、眩暈、頭痛及口乾、紫斑病、皮膚斑疹、過敏性皮膚病、噁心、嘔吐及胃腸障礙。

若有噁心、嘔吐之現象者，飯後服用即可避免，而不必因些許副作用而停止用藥治療。

「注意事項」：

1. 如患有心臟衰弱、腎臟病及肝臟病，可能因服用任何類利尿劑而發生電解質不平衡，本品也偶爾會發生，所以長期治療需定期測定血液電解質情形。
2. 使用本品可能引起輕微氮滯留現象。如停止用藥或隔日用藥則無此現象。如氮血症很明顯增加，則應停止用藥。
3. 本品具降壓效果，故與其他降壓劑合用，必須減少此降血壓劑用量。特別是神經節阻斷性降血壓劑與本品合用時，至少需減少一半用量，通常由醫生處方用之。
4. 如患肝硬變及脾腫大者，在血液檢查中會發現血小板和白血球數變化並非服用本品所引起，故此種病人須定時驗血。
5. 若本品與Spironolactone併用，醫師須常測定血鉀濃度。
6. Triamterene可能會減少氯離子保留作用，但無法證明會引起酸性中毒。
7. 如在低血鉀症情況，會增加毛地黃過敏現象發生。
8. Thiazide對Norepinephrine會減少動脈血管收縮，或增加Tubocurarine麻痺作用，因此患者於開刀時使用要小心。

「懷孕時注意事項」：

對動物及臨床作生育研究，證明未因使用Triamterene和Hydrochlorothiazide而致胎兒畸形現象。

但是本品只限用於有病症之懷孕婦女，應由醫師處方使用。

「適應症」：

高血壓利尿。

「用法・用量」：

成人用量(小孩不宜使用本品)

1. 高血壓症:開始時每天服用二次，飯後各一片，隨患者病情所需而異。
2. 水腫:開始一般用量為每天二次，飯後服一片，當水腫現象已被控制可改服用每天一片，或每兩天服用一片，每日最高劑量不得超過四片。

本藥需由醫師處方使用。

「超過劑量」：

如果有使用超過劑量的現象，理論上首先應注意的是體液電解質的不平衡，其次是噁心、

嘔吐、胃腸不舒服和虛弱。嚴重時可能發生低血壓症，可服用Levarterenol來控制血壓正常。和其他藥物一樣，如服用過量沒有特別解藥，故應立即洗胃、催吐，注意電解質變化和體液平衡。

「貯存」：

請存放於陰涼處，避免日光直射及兒童伸手不及處。

「包裝」：

4~1000粒 瓶裝，鋁箔盒裝。

仁興化學製藥股份有限公司

桃園縣大園鄉橫峰村中山南路448號