130*190mm-送審用

克傷風感冒液 Anticol liquid

PIC/S GMP優良藥品
衛署藥製字第032102號

【成　分】有效成分及含量：每ml中含有下列成分：

Acetaminophen.....15.3mg
Chlorpheniramine Maleate.....0.11mg
Caffeine anhydrous.....1.6.7mg
Ext. Glycyrrhiza Radix甘草浸膏.....1.67mg
Ext. Cinnamonomi Cortex桂皮浸膏.....0.011mg

其他成分(賦形劑)：Sucrose、Sorbitol Solution、Citric acid、Sodium Dehydroacetate、Caramel Coloring、Ethanol、Purified Water

【用途(適應症)】感冒諸症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛等)。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：曾經因本藥引起過敏症狀的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1.3歲以下。
2.有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
3.吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
4.有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起之排尿困難的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1.孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2.正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥物。
3.同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
4.服用鎮靜藥或安眠藥的人。

四、其他使用上注意事項：

1.為防止兒童誤食請妥善保管。
2.避免陽光直射。
3.勿超過建議使用劑量。
4.使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
5.不要服用本藥超過七日。
6.服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
7.酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen（Paracetamol）有急性肝衰竭的風險。
8.可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
9.不得與酒精性飲料併用。
10.避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】飯後服用

年齡	用法用量
成人及12歲以上	每次10c.c.一天3-4次飯後服用
6歲以上未滿12歲	適用成人劑量1/2(每次5c.c.)
3歲以上未滿6歲	適用成人劑量1/4(每次2.5c.c.)
3歲以下之嬰幼兒	不宜自行使用

【警　語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
胃腸道	噁心、嘔吐、食欲不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1.若有任何不適情況發生。
2.咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
3.症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
4.喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
5.服用過量[每日超過Acetaminophen 4,000毫克(mg)]，或服藥後出現下列症狀：腸胃道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
6.有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其他皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包　　裝】60 ~ 4000 毫升玻璃瓶裝
【類　　別】醫師藥師藥劑生指示藥品。
【儲　　存】避光儲存

【委託者】慶昌藥品有限公司
【地　址】屏東市公勇路123號
【製造廠】台灣陽生製藥工業股份有限公司
【地　址】屏東市龍華路381號

106/09/04-1/修