ACG

益喀素顆粒 20 毫克/公克

Equsil Granules 20mg/gm〝LITA〞(Acetylcysteine)

【成分】每公克含：

有效成分及含量：Acetylcysteine……20 mg

其他成分(賦形劑)：D-Mannitol、Cyclodextrin-Beta、Sugar、Orange Powder、Sunset Yellow FCF

【用途(適應症)】減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用:

曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治:

(一)吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾(慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起的咳嗽及咳嗽有膿痰的人。

(二)3 歲以下。

(三)支氣管性氣喘及伴有呼吸功能不全的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生:

(一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二)65 歲以上

四、其他使用上注意事項:

(一)為防止兒童誤食請妥善保管。

(二)避免陽光直射。

(三)勿超過建議使用量。

(四)不得與含酒精飲料併用。

(五)本藥會導致支氣管分泌物的增加，使用後應仔細觀察，如無法自行咳出，建議採用變換姿勢、拍痰或機械抽取等適當的處理步驟。

【用法用量】

年齡	劑量
成人及 12 歲以上	一天 3 次，每次 10 公克(2 包)。
6 歲以上未滿 12 歲	一天 3 次，每次 5 公克(1 包)。
3 歲以上未滿 6 歲	一天 3 次，每次 2.5 公克(1/2 包)。
3 歲以下	請洽醫師診治。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治:

(一)若有任何不適情況產生。

(二)有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上的咳嗽，或有復發情形。

(三)消化道:偶有噁心、嘔吐、食慾不振、輕微硫磺味臭氣溢出等不悅感。

偶有發疹等過敏症狀。

其他:偶有血痰、惡寒、發熱、鼻水流不停、口內炎症狀發生。

【包裝】5 公克鋁箔袋裝，6～200 包盒裝。

【儲存】25℃以下避光儲存。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【諮詢電話】04-26872345

4 711457 272662

衛署藥製字第 032208 號

利達製藥

利達製藥股份有限公司

LITA PHARMACY CO., LTD.

台中市大甲區中山路一段 906 號 消費者服務專線 04-26872345