外用　　衛署藥製字第 032538 號

膚速可優乳膏

Fusukon-U Cream

綱號：H36

成分：Each gm contains：

Betamethasone Valerate eq. to Betamethasone……..…..…0.5mg

Gentamicin Sulfate…….…1mg(potency)

Tolnaftate……10mg

Iodochlorhydroxyquin……10mg

適應症：治療皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬(香港腳)、股癬、汗斑、濕疹或皮膚炎、急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染。

效能：本劑用以治療各種濕疹及其他感染過敏和發炎性皮膚病、原發性及續發性之細菌感染或黴菌感染包括接觸性皮膚炎、細菌性皮膚炎、毛囊皮膚炎、濕疹樣皮膚炎、膿性皮炎、四肢慢性皮膚炎、對光敏感性皮膚炎、神經性皮膚炎、溢脂性皮膚炎、溢脂性濕疹、帶狀性○疹、汗○ 鼠蹊皮膚病、皮膚搔癢症、不全角化、甲溝炎、對磨疹、膿○性痤瘡、枕骨帶狀○疹、紅癬、苔癬化鼠蹊皮癬菌病和黴菌感染如體癬、股癬、足癬。

用法用量：醫師藥師藥劑生指示藥品。

1.每天 2 次將本劑適量塗擦於患處。

2.治療之期間依症狀進展而定，如足癬通常須要 2~4 週的治療。

副作用：

抗生素：1.過敏性皮膚炎。2.繼發性感染

抗黴菌劑：1.局部皮膚刺激及灼熱感。2.過敏性皮膚炎。3.紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。

類固醇：

1.局部性：搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、續發性感染、多毛症、皮膚萎縮、痱子、毛細管擴張。

2.全身性：庫欣氏症候群 (Cushing's

3.除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。

4.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

5.除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四週或黏膜。

6.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。

7.使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。

8.除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。

9.塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。

10.深部皮膚組織感染請就醫治療。

11.黴菌治療至少二星期，使用此藥須完成全程療程。

12.一般黴菌治療一星期症狀會改善，股癬和體癬經二星期，足癬經四星期，治療症狀若沒有改善應停藥立即就醫，即使若症狀有改善，停藥後若病情復發應停藥立即就醫。

13.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，類固醇或非類固醇抗發炎劑，不可連續使用超過二星期。

警語：

抗生素：

1.對藥物各成分過敏者不得使用。

2.長期使用有可能引起繼發性感染。

3.會使衣物染色。

抗黴菌劑：對藥物各成分過敏者不得使用。

類固醇：

1.對藥物各成分過敏者不得使用。

2.小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。

3.癬類或其它皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。

syndrome，如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)、繼發性腎上腺功能不足(Secondary adrenal insufficiency，如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕，低血壓、腹痛、便祕或腹瀉等)。

4.臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。

5.皮膚的黴菌感染有時不易與其它皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。

包裝：100公克以下管裝。

注意事項：

1.須置於小孩接觸不到之處。

2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路23號 TEL：(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口182-1號

Size:113X165mm　C版　　93.06.10.