

外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	"南光"舒而通輸注液20%(甘露醇)	申請廠商	南光化學製藥股份有限公司
衛生福利部給證號碼	衛署藥製字第033425	號	

2016-12-30



310

"南光" 舒而通 輸注液 20% (甘露醇) Sunnytol Infusion Solution 20% "N.K."

【成分名(中文名)】 Mannitol (甘露醇)

【劑型、含量】 注射劑：每毫升含D-Mannitol 200 mg

【賦形劑】 Water for Injection。

【臨床藥理】

一、滲透壓降壓作用：依文獻資料，通常在輸注後 15 分鐘可發生效用。

- 具有縮小腦容積及降低腦壓之作用。
- 降低急鬱血性青光眼內壓上升。

二、利尿作用：依文獻資料，一般於使用後 1-3 小時可發生效用。

- 能增加腎血流量。
- Mannitol 能保持原狀迅速通過腎絲球且不被腎小管再吸收（80%的劑量在 3 小時內排於尿中），因而能提高腎絲球過濾原尿之滲透壓，並抑制腎小管對鈉、氯或其他電解質之再吸收，促進水分之排除而達到利尿之作用。
- 由於利尿作用增加毒性物質之排除而免除毒物對腎臟造成之毒性。
- 與平滑肌鬆弛劑併用，可促進尿道結石之自然排出。
- 能誘出組織中過多的水分貯留體內，故能改善由腎損害及心臟功能不全等所引起之浮腫、肝及肺鬱血、腹水等症狀。
- 能預防及改善因外傷或手術而引起之尿少症及無尿症。
- 能大量增加尿排出量，故能阻止腎小管中沈澱物或結石之生成，使腎小管流暢無阻。
- 阻止泌尿器官手術後血尿凝固，並能防止因而引起之二次感染。
- 可作為人工心肺裝置，人工腎臟等之灌流液。

【適應症】

利尿、降顱內壓、腦水腫，促進毒物之尿中排除、腎小球過濾速率之測定（診斷用）。

【用法用量】 本藥限由醫師使用。

滲透壓降壓作用：靜脈輸注，每公斤體重 0.5g~2 gm 以 15~25% 溶液，點滴輸注 30~60 分鐘。

利尿作用：靜脈輸注，50~100 gm (或兒童 2 gm/kg 或每公尺體表面積 60 mg) 的 5~25% 溶液，以維持尿液每小時流量至少為 30~50 mL 之速率點滴輸注。

診斷用（腎功能）：靜脈輸注，每公斤體重 200 mg 以 15~25% 溶液於 3-5 分鐘內注入體內。


腎小球過濾速率測定：靜脈輸注，20 gm(20%溶液 100 mL) 以 180 mL 氯化鈉注射液稀釋成 7.2% 甘露醇溶液，以每分鐘 20 mL 之速率給藥。

【注意事項】

- 禁忌：無尿症、嚴重的肺水腫或鬱血性心衰竭，顱內出血，嚴重脫水。12 歲以下孩童禁用。
- 在人體懷孕及授乳者之安全性尚未建立，應權宜利弊使用。

外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	"南光"舒而通輸注液20%(甘露醇)	申請廠商	南光化學製藥股份有限公司
衛生福利部給證號碼	衛署藥製字 第 033425 號		



※外文仿單應檢附中文譯文