

“長安”

咳友糖漿

Coio Syrup “C.A.”

【成分】 Each ml Contains :

Chlorpheniramine Maleate.....	0.4	mg
Phenylephrine Hydrochloride.....	2	mg
Ammonium Chloride.....	20	mg
Guaiacol Glyceryl Ether.....	10	mg
Codeine Phosphate.....	0.9	mg

【賦形劑】

Methylparaben, Butylparaben, Potassium Sorbate, New Coccin, Grapefruit, Prune Flavour, Sucrose, Sorbitol, Menthol, Glycerin, Purified Water。

【作用】

本劑為一種有效的鎮咳、祛痰糖漿，其成分係採用磷酸可待因能抑制咳嗽反射作用，為鎮咳劑並配合祛痰劑 Ammonium chloride、Guaiacol Glyceryl ether 及支氣管擴張劑 Phenylephrine hydrochloride；具有 Sympathomimetic 之作用，能收縮粘膜血管，解除鼻腔之充血現象，用於過敏性鼻炎。本品係由多種成分互相配合，對於咳嗽之緩解可發揮效果。

【適應症】 鎮咳、祛痰。

【用法用量】 通常成人每次服 5ml，6~12 歲服 2.5ml，一日 4 次。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【副作用】 輕微的暈眩、思睡、噁心、嘔吐及胃痛。

【注意事項】

- 1.服用本劑數次仍未見症狀改善時應即停用。
- 2.服用本劑應避免開車。
- 3.須置於小孩接觸不到之處。
- 4.避免陽光直射、宜保存於陰涼之處。
- 5.除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 6.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
- 7.使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。

【警語】

- 1.吸煙、慢性阻塞性肺疾 (Chronic Obstructive、Pulmonary Disense，包括氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫) 所引起之持續或慢性咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽患者請勿自行使用。
- 2.有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
- 3.本劑含祛痰劑宜空腹服用。
- 4.長期使用易致成癮。
5. (1) 早產兒、1 歲以下嬰兒及 1~2 歲幼兒，不建議使用；
(2) 2~12 歲兒童，依年齡減量使用；
(3) 肝、腎功能不全者，應小心謹慎減量使用。

【儲存條件】 25℃以下避光儲存。

衛署藥製字第 033478 號

【包裝】 5~60 毫升塑膠瓶裝、玻璃瓶裝

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號