

107x177mm

● Oballergen + Biotin 製劑 ●

“大豐”
抗過敏原豪 注射液
OBALLERGEN-H INJECTION "T.F."

【成 分】每ml中含有：

Chlorprophenpyridamine Maleate.....	1mg
Riboflavin.....	5mg
Pyridoxine Hydrochloride.....	5mg
DL-Methionine.....	20mg
Biotin(Vitamin H).....	250mcg
Nicotinamide.....	10mg
Thiamine Hydrochloride.....	2.5mg

【賦 形 劑】

Benzyl Alcohol, Thiourea, Water for Injection.

【特 徵】

本廠抗過敏原注射液(Oballergen Inj.)出品以來，Chlorprophenpyridamine Maleate, DL-Methionine 維生素 VitaminB2及B6，因此其藥效確實，作用溫和，故已博得廣大使用者之好評，然本劑使用於皮膚科範圍則對於剝離性皮膚炎或皮脂漏等皮膚疾患稍有效力不足之感，但查剝離性皮膚炎及皮脂漏等症均為缺乏一種叫做 Biotin 之維生素所致。

本廠璧及此乃以 Biotin 及有連帶作用之 Nicotinamide, Vitamin B1 等物添加於抗過敏原注射液之原有成分製成此抗過敏原豪注射液(Oballergen-H)。本劑非但具有抗過敏原注射液原有之優點，同時亦具有 Biotin 之優秀作用及原有成分和新增成分之相乘作用。

【適 應 痘】

急慢性濕疹、蕁麻疹、皮膚炎、過敏性皮膚搔癢症、口內炎、口角糜爛症、剝離性口脣炎、痤瘡、支氣管氣喘、過敏性鼻炎。

【用法用量】

通常一日1~2次。每次注射一安瓿(2ml)於皮下或肌肉內，連用數天後如尚無效果時不妨增加每日注射次數為3次以上，如症狀轉好則減少為每日一次以為維持量即可。

【注意事項】

1. 本藥限由醫師使用。
2. 注射本劑後數小時內所排出之尿為黃色，但為常態當勿須介慮。
3. 天氣寒冷時則可能有結晶析出，但加溫溶解使用之，效力不變。
4. 本劑應貯存於暗處。
5. 副作用：
(1) 偶有頭痛、嗜眠症狀。
(2) 偶有口渴現象。

6. 使用本劑者應避免開車。

【包 裝】2ml × 100Amp。

衛署藥製字第 033564 號



GMP 藥廠
大豐製藥股份有限公司
公司、工廠：彰化市延平里岸頭巷11號