

綜合感冒治療劑

風拿好爾® 液

KAZENAHOLU® Liquid

衛署藥製字第033576號 G.M.P. G-2179

氣候變化無常，稍不留心，容易罹患感冒，感冒期間，人體虛弱，身體倦怠、精神萎靡不振，並伴有頭痛、鼻塞、咳嗽諸症狀，需儘快予以治療。

本製劑主成分具有強力的鎮痛解熱之作用，再配合著支氣管平滑肌弛緩劑，抗組織胺劑、鎮咳祛痰劑等藥物，使藥效加強，對於感冒諸症狀，具有顯著的緩解作用，實為一優良之綜合感冒治療劑。

【成 分】 Each ml Contains:

Acetaminophen.....	15mg
Chlorpheniramine Maleate.....	0.12mg
DL-Methylephedrine Hydrochloride.....	0.5mg
Caffeine Anhydrous.....	1.5mg
Guaiifenesin.....	2.5mg
Glycyrrhiza Extract.....	6mg
Eleutherococcus Senticosus(刺五加)	

Sodium Dehydroacetate、Caramel、Sucrose、Sodium Cyclamate、Alcohol、Cassia Oil、Tween 80、Butyl Paraben、Sodium Erythorbate(Liquostabil)、Propylene Glycol、Polyoxyethylene (60) Hydrogenated Castor Oil、Purified Water

【適應症】 感冒諸症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咳嗽、喀痰、發熱、頭痛)之緩解。

【用法用量】 通常成人一日三次，飯後服用，15歲以上~成人，每次10ml，11歲以上未滿15歲每次6.5ml，7歲以上未滿11歲每次5ml，3歲以上未滿7歲，每次3ml，3歲以下之嬰幼兒，使用前請洽醫師。醫師藥師藥劑生指示藥品。

【副作用】

1. Acetaminophen: 偶有過敏反應，在建議劑量下使用少有副作用發生，長期服用超大劑量會引起肝otoxicity，在兒童急性中毒劑量小於150mg/kg。
2. Chlorpheniramine Maleate :嗜睡、口乾、倦怠感、視覺模糊、錯亂、小便困難、心跳加快。
3. Caffeine : 神經質、興奮、睡不著與心搏加快。

【注意事項】

- 1.須置於小孩接觸不到之處。
- 2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 3.除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 4.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
- 5.本劑為液劑，使用前須搖勻。

【警語】

- 1.服用後，若有發疹、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，必須停藥立即就醫。
- 2.除非藥師、藥劑生或醫師指示，3歲以下不建議自行使用。
- 3.除非藥師、藥劑生或醫師指示，本劑含咖啡因(Caffeine)12歲以下不得服用。
- 4.除非藥師、藥劑生或醫師指示，曾經因藥物引起之過敏症狀者不得使用。
- 5.若咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛、應停藥立即就醫。
- 6.吸煙、慢性阻塞性肺疾、如氣喘、性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽，請勿自行使用本類藥品。
- 7.服用含抗組織胺之本類藥品後，駕車或操作危險機械時要小心。
- 8.除非藥師、藥劑生或醫師指示，下列病患勿服用含抗組織胺之本類藥品：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。
- 9.不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
- 10.不要服用本類藥物超過七天。
- 11.服用本類藥品後，如果症狀沒有改善，或症狀還伴隨有發燒、或發燒持續三天，應停藥立即就醫。
- 12.服用本類藥品後，如喉嚨痛持續二天以上並有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
- 13.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，有心臟病或高齡者不得服用此類製劑。
- 14.服用本類製劑應限制再服用含咖啡因藥品，飲料(如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張與興奮失眠且常會引起心博過速。
- 15.酒精警語：若你每天喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問你的醫師，你是否能服用Acetaminophen或其它鎮痛解熱劑，因為Acetaminophen可能造成肝損害。

16.本藥含acetaminophen(paracetamol)成分，應注意下列事項：

(一)肝毒性：

- a.使用acetaminophen(paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日4,000毫克的acetaminophen所致，且多涉及使用超過一種以上含acetaminophen成分之藥品。
- b.醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有acetaminophen或paracetamol成分，不可同時使用超過一種以上含有acetaminophen成分之藥品。如果一天誤服超過4,000毫克的acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。

(二)與酒精併用：慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用acetaminophen而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。

(三)過量：

- a.服用過量acetaminophen會在服藥24小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。
- b.本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。
- c.Acetaminophen過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後48~72小時才明顯可見。

(四)過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用acetaminophen相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。

(五)嚴重皮膚反應：使用acetaminophen的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿皰病（Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP）、史蒂文氏-強生症候群（Stevens-Johnson Syndrome, SJS）和毒性表皮壞死溶解症（Toxic Epidermal Necrolysis, TEN）。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

【包裝】10~4000公撮瓶裝。



PIC/S GMP藥廠

中美兄弟製藥股份有限公司

彰化市彰鹿路106號 諮詢專線:04-7524166

健康訊息請參閱網站 <http://www.健康之道.tw>