"長安"

旅途樂錠

Litolou

Tablets "C.A."

<鳳梨口味>

成分： Each Tablet Contains :

有效成分及含量 Meclizine Hydrochloride ……25mg
Pyridoxine Hydrochloride ……7mg

其他成分(賦形劑) Lactose, Starch, Calcium Phosphate Dibasic, Hydrophobic Silicon Dioxide, Silicon Dioxide, Menthol, Citric acid, Sodium Saccharin, Tartrazine, Povidone, Sunset Yellow FCF, Magnesium Stearate, Sodium Starch Glycolate, Ethanol, Pineapple Flavor

用途(適應症)：預防或緩解動暈症（暈車、暈船、暈機）引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。

不得使用族群：曾因本藥成分引起過敏的人。

用法用量：

成人及 12 歲以上	預防暈車、暈船、暈機時，於搭乘前 30～60 分鐘服用之，1 次 2 錠，一天服用 1 次。
12 歲以下	請洽醫師診治。

注意事項；請詳閱說明書後使用

類別；醫師藥師藥劑生指示藥品

儲存條件：25℃以下避光儲存

衛署藥製字第 034239 號

製造批號：

保存期限：

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉萬豐村福工路 19 號、19-1 號

“長安”

旅途樂錠

Litolou

Tablets “C.A.”

<人參口味>



長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉萬豐村福工路 19 號、19-1 號

成分： Each Tablet Contains :

有效成分及含量 Meclizine Hydrochloride ……25mg
Pyridoxine Hydrochloride ……7mg

其他成分(賦形劑) Lactose, Starch, Calcium Phosphate Dibasic, Hydrophobic Silicon Dioxide, Silicon Dioxide, Menthol, Citric acid, Sodium Saccharin, Tartrazine, Povidone, Sunset Yellow FCF, Magnesium Stearate, Sodium Starch Glycolate, Ethanol, Ginseng Flavor

用途(適應症)：預防或緩解動暈症（暈車、暈船、暈機）引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。

不得使用族群：曾因本藥成分引起過敏的人。

用法用量：

成人及 12 歲以上	預防暈車、暈船、暈機時，於搭乘前 30～60 分鐘服用之，1 次 2 錠，1 天服用 1 次。
12 歲以下	請洽醫師診治。

注意事項：請詳閱說明書後使用
類別；醫師藥師藥劑生指示藥品
儲存條件：25℃以下避光儲存
衛署藥製字第 034239 號

製造批號：

保存期限：

"長安"

旅途樂錠

Litolou

Tablets "C.A."

<草莓口味>

成分： Each Tablet Contains :

有效成分及含量 Meclizine Hydrochloride ……25mg
Pyridoxine Hydrochloride ……7mg

其他成分(賦形劑) Lactose, Starch, Calcium Phosphate Dibasic, Hydrophobic Silicon Dioxide, Silicon Dioxide, Menthol, Citric acid, Sodium Saccharin, Tartrazine, Povidone, Sunset Yellow FCF, Magnesium Stearate, Sodium Starch Glycolate, Ethanol, Strawberry Flavor

用途(適應症)：預防或緩解動暈症（暈車、暈船、暈機）引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。

不得使用族群：曾因本藥成分引起過敏的人。

用法用量：

成人及 12 歲以上	預防暈車、暈船、暈機時，於搭乘前 30～60 分鐘服用之，1 次 2 錠，1 天服用 1 次。
12 歲以下	請洽醫師診治。

注意事項：請詳閱說明書後使用

類別：醫師藥師藥劑生指示藥品

儲存條件：25℃以下避光儲存

衛署藥製字第 034239 號

製造批號：

保存期限：

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉萬豐村福工路 19 號、19-1 號

"長安"

旅途樂錠

Litolou

Tablets "C.A."

<薄荷口味>



長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉萬豐村福工路 19 號、19-1 號

成分： Each Tablet Contains :

有效成分及含量 Meclizine Hydrochloride ……25mg
Pyridoxine Hydrochloride ……7mg

其他成分(賦形劑) Lactose, Starch, Calcium Phosphate Dibasic, Hydrophobic Silicon Dioxide, Silicon Dioxide, Menthol, Citric acid, Sodium Saccharin, Tartrazine, Povidone, Sunset Yellow FCF, Magnesium Stearate, Sodium Starch Glycolate, Ethanol, Peppermint Flavour

用途(適應症)：預防或緩解動暈症（暈車、暈船、暈機）引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。

不得使用族群：曾因本藥成分引起過敏的人。

用法用量：

成人及 12 歲以上	預防暈車、暈船、暈機時，於搭乘前 30～60 分鐘服用之，1 次 2 錠，1 天服用 1 次。
12 歲以下	請洽醫師診治。

注意事項：請詳閱說明書後使用

類別；醫師藥師藥劑生指示藥品

儲存條件：25℃以下避光儲存

衛署藥製字第 034239 號

製造批號：

保存期限：

"長安"

旅途樂錠

Litolou

Tablets "C.A."

<甜橙口味>

成分： Each Tablet Contains :

有效成分及含量 Meclizine Hydrochloride ·····25mg
Pyridoxine Hydrochloride ·····7mg

其他成分(賦形劑) Lactose, Starch, Calcium Phosphate Dibasic, Hydrophobic Silicon Dioxide, Silicon Dioxide, Menthol, Citric acid, Sodium Saccharin, Tartrazine, Povidone, Sunset Yellow FCF, Magnesium Stearate, Sodium Starch Glycolate, Ethanol, Orange Flavor

用途(適應症)：預防或緩解動暈症（暈車、暈船、暈機）引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。

不得使用族群：曾因本藥成分引起過敏的人。

用法用量：

成人及 12 歲以上	預防暈車、暈船、暈機時，於搭乘前 30～60 分鐘服用之，1 次 2 錠，1 天服用 1 次。
12 歲以下	請洽醫師診治。

注意事項：請詳閱說明書後使用

類別；醫師藥師藥劑生指示藥品

儲存條件：25℃以下避光儲存

衛署藥製字第 034239 號

製造批號：

保存期限：

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉萬豐村福工路 19 號、19-1 號

"長安"

旅途樂錠

Litolou

Tablets "C.A."

<葡萄口味>



長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉萬豐村福工路 19 號、19-1 號

成分： Each Tablet Contains :

有效成分及含量 Meclizine Hydrochloride ·····25mg
Pyridoxine Hydrochloride ·····7mg

其他成分(賦形劑) Lactose, Starch, Calcium Phosphate Dibasic, Hydrophobic Silicon Dioxide, Silicon Dioxide, Menthol, Citric acid, Sodium Saccharin, Tartrazine, Povidone, Sunset Yellow FCF, Magnesium Stearate, Sodium Starch Glycolate, Ethanol, Grape Flavor

用途(適應症)：預防或緩解動暈症（暈車、暈船、暈機）引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。

不得使用族群：曾因本藥成分引起過敏的人。

用法用量：

成人及 12 歲以上	預防暈車、暈船、暈機時，於搭乘前 30～60 分鐘服用之，1 次 2 錠，1 天服用 1 次。
12 歲以下	請洽醫師診治。

注意事項：請詳閱說明書後使用

類別；醫師藥師藥劑生指示藥品

儲存條件：25℃以下避光儲存

衛署藥製字第 034239 號

製造批號：

保存期限：