

# 利尿劑

"羅得" 優尿錠 1 公絲(布米他奈)

Urenide Tablets 1mg "ROOT"  
(Bumetanide)

衛署藥製字第 034283 號

GMP G-2478

本品主要作用於亨利氏蹄系的上行枝，抑制鈉的重吸收，增加尿量及鈉、氯離子之尿中排泄，健康成人口服後 30-60 分鐘即呈利尿作用，1-3 小時內達最大效果，持續 3-5 小時。

「成分」：每錠含：

Bumetanide..... 1mg

「賦形劑」：Lactose、Starch、Povidone、Avicel、Tartrazine、Carmellose Sodium、Magnesium Stearate

「適應症」：

水腫、利尿。

「用法用量」：成人 1 日 1-2mg，連日或隔日使用。

本藥須由醫師處方使用。

「注意事項」：

1. 一般注意：利尿效果快速，因此應十分注意電解質平衡失調及脫水，須先少量投與，再慢慢增量。
2. 禁忌：肝性昏睡患者，體液中鈉、鉀明顯減少患者，無尿患者。
3. 慎重投與：進行性肝硬化患者，重症肝、腎障害患者，本人及雙親、兄弟有痛風、糖尿病患者，正服用毛地黃劑、副腎皮質素之患者。
4. 副作用：
  - a. 偶有低血鈉、低血鉀等電解質失調現象，高尿酸血症，因此應注意觀察，遇有此異常症狀時減量或停藥。
  - b. 偶有發疹、皮膚搔癢感等過敏症狀出現，停藥即可。
  - c. 偶有噁心、嘔吐、食慾不振、胃部不快、腹痛、下痢等現象。
  - d. 偶有耳鳴、眩暈、頭痛、脫力、倦怠感。
5. 孕婦投與：懷孕中投與之安全性尚未確立，因此懷孕及可能懷孕之婦女投與時應先衡量利弊得失。
6. 相互作用：
  - a. 與其他降壓劑同時併用降壓作用會增強，降壓劑的用量應調節。
  - b. 與 Streptomycin、Kanamycin 等對第 8 腦神經有障害之抗生素併用，會增強聽力障害，此避免與此等抗生素併用。
  - c. 與 Cephalosporin 系抗生素併用會增加腎毒性，併用時宜慎重投與。
7. 貯存：室溫、避光保存。

「包裝」：4-1000 錠瓶、盒裝。

羅得化學製藥股份有限公司  
台中市大甲區東西七路一段 65 號