

“瑞安” 利糖妥 錠
(格力匹來)
"Purzer" Glutrol Tablet
(Glipizide)

瑞安大藥廠股份有限公司

PURZER PHARMACEUTICAL CO., LTD.

PIC/S GMP 衛署藥製字第034621號 GMP 優良藥品G-2601號
本藥須由醫師處方使用

本劑主含Glipizide，是一種口服Sulfonylureas類降血糖製劑，用來治療非胰島素依賴型糖尿病(Non-Insulin Dependent Diabetes)。經國際知名醫學中心的研究結果顯示，Glipizide具有極佳的降血糖效果，同時其毒性極低。

【成分】

每錠含Glipizide 5 mg

賦形劑：

Lactose Monohydrate, Microcrystalline Cellulose, Colloidal Silicon Dioxide, Magnesium Stearate, Corn Starch

【適應症】

糖尿病。

【用法用量】

使用的劑量是因人而異，主要是根據定時的血糖檢查結果來調整劑量。一般而言，使用本劑2.5 mg ~ 20 mg (即1/2錠至4錠)即可有效控制血糖。為達到有效控制血糖，建議將每天劑量分2~3次在餐前30分鐘口服本劑。

- 第一次使用降血糖藥物者

建議由每天1/2錠至1錠開始，再依定期血糖檢查結果逐次調整劑量至血糖被穩定控制為止。

- 在使用其他降血糖藥物者

使用應依此病患的新陳代謝情況及所使用中的藥物或治療方法而定。但無論如何，建議在嚴密的觀察下，由低劑量開始治療，再逐步調整劑量至血糖控制結果滿意為止。有時，在新舊藥物更替期間，必須暫停原來使用的藥物。

- 在使用胰島素(Insulin)者

有部份患者，併用Glipizide時可減低胰島素的使用量。但在治療初期，必須定期檢查血糖。

【動物實驗】

經過廣泛且深入的動物實驗，其結果顯示Glipizide會降低實驗動物的正常血糖，同時也會拮抗經由人工引發的高血糖症(Hyperglycemia)。經由一系列的體內及體外試驗結果顯示，本劑主要的作用是刺激胰臟的Beta-Cell分泌胰島素(Insulin)。進一步，長期的動物實驗亦證明 Glipizide的毒性極低。

【臨床藥理學】

本劑可完全在腸道內迅速吸收，故其作用快速且穩定。經口服30分鐘後，即可產生降血糖效果。本劑在體內代謝後，絕大部份是以沒有活性的代謝物經由尿液排出體外。因此，每次餐前服用本劑，即可有效的控制餐後高血糖現象，並可避免本劑在體內蓄積而引起血糖過低的症狀。

【臨床應用】

依臨床上，Glipizide在許多先進國家已廣泛使用於成年型糖尿病(Maturity-onset Diabetes)多年，結果均一再證實Glipizide是有效且安全的降血糖藥物。

【禁忌】

與其他 Sulfonylureas 類降血糖藥物一樣，下列疾病患者忌用本藥：胰島素依賴型糖尿病(Insulin Dependent Diabetes)、糖尿病酮酸中毒(Ketoacidosis Diabetes)、糖尿病性昏迷(Diabetic Precoma or Coma)、孕婦、嚴重肝或腎功能不全者、腎上腺機能不足者 (Adrenal Insufficiency)、及對本藥物過敏之患者。

【注意事項】

1. 本劑或 Sulfonylurea 類降血糖藥物僅適用於非胰島素依賴型糖尿病(Non-Insulin Dependent Diabetes)。
2. 本劑或 Sulfonylurea 類降血糖藥物與下列藥物併用時，會增強降血糖作用：Dicoumarol 及其衍生物、Monoamine Oxidase Inhibitors 、 Sulphonamides 、 Phenylbutazone 與其衍生物、Chloramphenicol 、 Cyclophosphamide 、 Probenecid 、 Pheniramidol 、 Salicylates 。
3. 本劑或 Sulfonylurea 類降血糖藥物與下列藥物併用時，會減弱降血糖作用： Adrenalin 、 Corticosteroids 、 Contraceptives 、 Thiazide Diuretics 。
4. 服用本劑或 Sulfonylurea 類降血糖藥物後，再飲用酒精類飲料時，會引起類似 Antabuse 的反應。
5. 本劑與 Beta-Blockers 製劑併用時，請特別小心謹慎。
6. 病患必須謹慎遵守醫師對食物、藥品劑量，及服用時間的指示。
7. 病患同時必須學習迅速察覺低血糖的早期症狀，如頭痛、易受刺激、睡眠不適、震顫、多汗等症狀，以便病患可以即早接受治療。
8. 請放置在孩童無法取得的地方。

【副作用】

1. 老年或身體衰弱病患，或不尋常的過度運動，不規則進食，喝酒精類飲料，或肝、腎功能不全者，可能會發生血糖過低現象。
2. 偶見胃腸障礙(如噁心、上腹飽脹感)，及頭痛現象。這些症狀通常與服用劑量有關，如予降低劑量，同時維持新陳代謝的平衡，則上述症狀即可緩解。
3. 偶見短暫性皮膚過敏反應，但繼續治療時，通常症狀會自動消失。
4. 罕見造血系統方面的異常報告，且通常會自動復原。

【儲存條件】

本品應於室溫下避光貯存。

【包裝種類】

2 ~ 1000錠瓶裝、鋁箔盒裝。

瑞安大藥廠股份有限公司

地 址：台北市松山區光復南路1號12樓之2

製造廠：瑞安大藥廠股份有限公司觀音廠

地 址：桃園市觀音區草漯里大同一路26號

服務電話：(02)2766-0887

C0104103