

非比林系小兒感冒治療劑

"羅得" 利康兒 顆粒

Ricol Granules "Root"

衛署藥製字第 034897 號 G-2797

「成分」:每 gm 含:

Acetaminophen	100mg
Diphenhydramine Tannate	8mg
Hesperidine	4mg
Caffeine Anhydrous	10mg

「作用」:

(1)Acetaminophen:非比林系之解熱鎮痛劑,具有調節體溫及抑制疼痛中樞之作用,對發熱、頭痛、喉嚨痛具解熱鎮痛之效。

(2)Diphenhydramine Tannate:具抗組織胺作用對流鼻水、鼻塞、打噴嚏等感冒初期症狀有效。

(3)Hesperidine:具增強微血管之作用,增強咽喉氣管之微血管抵抗力,配合其他成分可減輕感冒的諸症狀。

(4)Caffeine Anhydrous:具增強鎮痛藥的效果,並能防止抗組織胺劑之思睡作用。

「適應症」:

感冒諸症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、發熱、頭痛)之緩解。

「用法用量」:

5-8 歲 1 次 1 包, 3-5 歲 1 次 1/2 包, 1 日 3 次, 飯後半小時內服用。

本藥須經醫師指示使用。

「注意事項」:

(一)下列兒童服用前,應請教醫師或藥師

(1)本人或雙親、兄弟等易引起蕁麻疹、紅腫、支氣管氣喘、過敏性鼻炎、偏頭痛、食物過敏等體質的兒童。

(2)曾患藥物過敏症狀的兒童(如發熱、發疹、關節痛、氣喘、搔癢等)。

(3)體弱、高燒的兒童。

(二)服用中請注意下列事項

(1)本劑中含有劇藥成分,應切實按照所定之用法用量。

(2)為避免重複服用,請勿與其他感冒藥同時使用。

(3)兒童服用時,應在指導監督下服用。

(三)服用中或後,請注意下列事項:

(1)服用本劑,出現發疹、發紅、嘔吐、噁心、食慾不振等症狀時,請中止使用,並請教醫師或藥師。

(2)經數次服用仍未見症狀改善時,應中止服用,並請教醫師或藥師。

(3)勿長期連用。

(四)保存:

(1)應保存於兒童伸手不及處。

(2)避光、保存於不潮濕、陰涼處。

「包裝」:

1 公克/包, 6-1000 包盒裝, 6-1000 公克罐裝。

羅得化學製藥股份有限公司

台中縣大甲鎮南北一路 2-13 號