

衛署藥製字第035055號

## 貝莎克軟膏

Becylic ointment

Each gm contains :

【主成分】：Betamethasone Dipropionate.....0.64mg  
(eq. to Betamethasone.....0.5mg)  
Salicylic Acid.....30mg

【賦形劑】：PEG 400、Glycerin、Tween 80、Span 60、  
Propylparaben、Stearic acid、  
Sodium metabisulfite、EDTA.2Na、  
Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil、  
Glycerylmonostearate、  
Glycerylmonostearate, self-emulsifying、  
Polyethylene homopolymer、White Vaseline

【作用】：1. Betamethasone Dipropionate是合成的皮質類固醇，  
具有抗發炎，止癢的作用。  
2. Salicylic Acid具有抑菌特性，還具有溶解角質作用。

【適應症】：慢性異位性皮膚炎、神經性皮膚炎(單純苔癬)、牛皮癬  
、濕疹、扁平苔癬、頭皮皮脂漏皮膚炎、汗皰、尋常性  
魚鱗癬等發炎症狀之解除。

【用法用量】：一日一至二次，早晚敷於患處。本藥須由醫師處方使用。

【禁忌】：對本品任一成份有過敏病史者禁用。

【注意事項】：1.如有刺激或過敏發生應停用本品。  
(依文獻記載) 2.封閉治療或大的身體表面使用時，可能有全身性副作用出現(腎上腺抑制)尤其是嬰兒及小孩。  
3.當出現乾燥和刺激感時，應停用本品。  
4.不可用於腹部。  
5.孕婦使用的安全性尚未確立，故勿讓孕婦大量或長期使用。

【副作用】：癢、刺激、灼熱、乾燥、多毛、起泡、低色素沉著、過敏性、接觸性皮膚炎、口周圍皮膚炎、封閉包紮下，會有皮膚浸軟、皮膚萎縮、皺摺、痱、起疹等現象發生。  
(依文獻記載)

【過量症狀】：長期過量使用corticosteroids，會抑制下視丘—腦下垂體功能，引起腎上腺功能抑制，長期過量使用本品會引起水楊酸中毒。  
(依文獻記載)

【治療方法】：急性皮質類固醇過多為可逆反應，停用本品即可改善，  
(依文獻記載) 如果需要，可以電解質不平衡來處理。水楊酸中毒時停用即可。再口服碳酸氫鈉來利尿。

【包裝】：1000公克以下塑膠瓶、軟管裝。  
【貯存】：25°C以下。



美西製藥有限公司  
高雄市仁武區工業一路九號

