

"羅得" 舒寧錠
Suring Tablets "ROOT"

衛署藥製字第035129號
GMP G-2913

【成份】：每錠中含：

Acetaminophen.....300mg
Codeine Phosphate.....6mg

【賦形劑】：Lactose、Potato Starch、Cellulose Microcrystalline、Povidone、
Erythrosine、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate

【作用】：

- 一、Acetaminophen為一非水楊酸之解熱、鎮痛劑，當感冒體溫升高時，他作用於熱調節中樞，促使皮下血管擴張，以達散熱作用，其鎮痛作用則是阻斷周邊痛覺受體與痛覺傳遞無之結合。
- 二、Codeine Phosphate為一鴉片衍生物，其鎮痛、鎮咳作用，其鎮痛、鎮咳效果主要是作用於痛覺及咳嗽中樞。本品口服吸收良好，口服後1小時可達血中最高濃度。

【適應症】：緩解感冒之各種症狀〈咳嗽、咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛〉。

【用法用量】：成人每次一錠，一日三次服用。

本品用於兒童，僅限於臨床效益大於風險時使用。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項及警語】：

- 1.禁忌：
 - (1)對本劑曾有過敏之患者。
 - (2)兒童扁桃腺及腺樣體切除術後止痛、已知CYP2D6快速藥物代謝者(ultra-rapidmetabolisers)及哺乳婦女。
- 2.a.一般注意：頭部受傷及腦脊髓壓過高之患者，使用本劑須注意。
 - b.年老患者：肝、腎功能不全者，愛迪生氏病患者，使用本劑須注意。
- 3.副作用：偶有畏光、倦怠、思睡、呼吸短促、噁心、嘔吐、便祕等現象。
- 4.藥物相互作用：
 - a.與 CNS 抑制劑同時使用時，會增強其抑制作用，須減量。
 - b.與 MAO 抑製劑同時使用時，會增強彼此之藥效，須減量。
- 5.懷孕婦女：懷孕婦女服用本劑之安全性尚未確立，懷孕婦女投與本劑時宜先衡量其利弊得失。
- 6.授乳婦女：本品是否分泌於乳汁中尚不可知，但授乳婦女服用本劑仍須注意。
- 7.長期使用會導致成癮。
- 8.早產兒、1歲以下嬰兒及1~2歲幼兒，不建議使用。
- 9.2~12歲兒童，依年齡減量使用。
- 10.肝、腎功能不全者，應小心謹慎減量使用。
- 11.肝毒性：
 - (1)使用acetaminophen (paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日4,000毫克的acetaminophen所致，且多涉及使用超過一種以上含有acetaminophen成分之藥品。
 - (2)過量服用acetaminophen可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有acetaminophen成分之藥品，因而造成用藥過量。
 - (3)有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用acetaminophen期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有acetaminophen或paracetamol成分，不可同時使用超過一種以上含有acetaminophen成分之藥品。如果一天誤服超過4,000毫克的acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。
- 12.與酒精併用：不得併服含酒精飲料，因為acetaminophen可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用acetaminophen而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。
- 13.過量：
 - (1)服用過量acetaminophen會在服藥24小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。
 - (2)本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。
 - (3)Acetaminophen過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後48~72小時才明顯可見。
- 14.過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用acetaminophen相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對acetaminophen過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。
- 15.嚴重皮膚反應：使用acetaminophen的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿皰病(Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)、史蒂文氏-強生症候群(Stevens - Johnson Syndrome, SJS)和毒性表皮壞死溶解症(Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

【酒精警語】：若你每天喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問醫師是否能服用本藥，因為acetaminophen可能造成肝損害。

【貯存方法】：避光、陰涼、防潮、室溫保存。

【包裝】：6-1000錠瓶裝。

羅得化學製藥股份有限公司

台中市大甲區東西七路一段65號