泌尿系統頻尿治療劑
"內外"

尿路平

錠 200公絲(福來沃賽)

Neropin Tablets 200mg
"N.W."(Flavoxate)

衛署藥製字第035425號
GMP：G-3041

Flavoxate HCl可直接作用於膀胱排尿肌，可緩解因神經刺激引起之膀胱過度收縮，且可迅速阻斷過度收縮引起之疼痛、痙攣之惡性循環。

【成分】每錠內含：
Flavoxate Hydrochloride…200mg

【適應症】
因慢性前列腺炎、膀胱炎所引起之頻尿、排尿困難、神經性之頻尿。

【用法用量】一次200mg，一日三次，視症狀增減之。本藥須由醫師處方使用。

【藥理作用】
一藥效藥理：
1.對膀胱排尿運動作用：
抑制膀胱充滿時的律動收縮，因膀胱三角部之筋放電活動減弱，使膀胱容量增大，尿意發現之遲延，因而使排尿次數減少。
2.對刺激膀胱緩解作用：
膀胱支配神經接觸骨盤神經並連接下腹神經之電氣刺激，而使膀胱收縮緩解，可改善因藥物誘發之膀胱過敏狀態。
3.對膀胱平滑肌之作用：
因對膀胱平滑肌之弛緩作用，而保持平滑肌之緊張性，使排尿力低下，保持正常之排尿力。

二臨床適用：
1.雙盲比較試驗：
主要以神經性頻尿、膀胱炎、前列腺炎爲對象，以Butyl Scopolamine，Bromide Placebo爲對照藥品，對雙盲檢比較試驗，對頻尿、殘尿感、尿意促迫、排尿時不快感有效。
2.對神經性頻率之有效爲56.7%，膀胱炎之有效率爲60.6%，前列腺炎之有效率爲47.4%。
副作用及臨床檢查值之變動：
副作用爲2.9%，其中胃腸障害、胃部不快感、噁心等之消化器症狀佔2.5%，臨床檢查GOT，GPT上昇，其它者則爲檢查值之特異報告。

【注意事項】
一禁忌：
1.幽門、十二指腸及腸管閉塞之患者。
2.下部尿路高度之通過障害之患者。
二慎重投與：
1.綠內障之患者。
2.以往有肝障害及肝障害患者。
三副作用：
1.消化器：胃部不快感、食慾不振、噁心、口渴、下痢、便秘等症狀。
2.過敏症皮膚發疹、搔癢感等之過敏症狀，有上述症狀，應中止停藥。
3.精神神經系：不眠、頭痛、頭部不適感，如有上之症狀應中止停藥。
4.眼：使眼睛疲勞、眼壓增高、調節障害。
5.血液：出現嗜酸球增多及白血球減少，有上述症狀，則應中止給藥。
6.肝臟：出現肝臟障害。
7.泌尿器：排尿困難、閉尿。
8.其它：下腹部膨脹感、顏面熱感、咽頭部違和感、嗄聲等。
四小兒之投與：
對小兒臨床評價安全性尚未確立，故應小心投與。
五妊娠婦之投與：
動物實驗認爲對胎兒有毒性，對任娠婦或可能妊娠之婦女應小心投與。

【貯存】室溫貯存。
【包裝】6～1000錠瓶裝及鋁箔盒裝。

內外化學工業股份有限公司
臺灣省雲林縣斗六市工業區復興路3號