

00357984



**sato** HEALTHCARE INNOVATION

## 腫脹寧軟膏

500國際單位 / 公克 (肝素鈉)

HEPARIN SODIUM OINTMENT 500IU/gm

ヘパリンナトリウム軟膏

衛署藥製字第035798號



### 【成分・分量】每公克含有

Heparin Sodium ..... 500 I.U.

### 【賦形劑】

White Petrolatum、Cetanol、NIKKOL BC-20TX、Tween 60、  
Propylene Glycol、Methyl Parahydroxybenzoate、  
Butyl Parahydroxybenzoate、Dibutylhydroxytoluene、  
Methyl Salicylate、Purified Water。

### 【作用・特點】

1. HEPARIN（肝素）係McLean於1916年從狗的肝臟抽出物所發現的一種具有抗凝血作用，屬於粘液多醣體的高分子物質；HEPARIN由結締組織內的肥滿細胞所產生，廣泛存在於高等動物的肝、肺、腎、腸、肌肉及血管等組織體內。HEPARIN乃是一種全身性的抗凝血劑，由於經皮吸收良好，因此可作為外用劑，以抑制血液凝固、纖維形成及預防瘢痕形成等為目的，可當作局部性疾患的治療劑。
2. 腫脹寧軟膏係使用乳劑型基劑製成的白色～淡黃白色軟膏，腫脹寧軟膏的有效成分HEPARIN SODIUM乃由健康食用家畜的肝、肺或腸粘膜等器官抽取而製得，為白色～灰褐色粉末或粒狀物，無臭，可溶於水且具吸濕性。
3. HEPARIN SODIUM與其他輔助因子共同作用，而阻礙血液凝固機轉中凝血因子IX・X的活性化；同時可阻礙PROTHROMBIN特化成THROMBIN，進而抑制FIBRINOGEN轉化成FIBRIN而達到抗凝血作用；另外，還可抑制血小板的粘著及凝集，進而抑制血液凝固及纖維形成。基於上述作用，HEPARIN SODIUM具有改善血栓性疾患，血行障礙及纖維形成疾患等效能。

### 【適應症】

對局部腫脹之輔助治療，其明確療效仍待建立。

### 【用法・用量】本藥須由醫師處方使用

1日1次～數次，取適量塗擦於患部及其周圍，或先將軟膏塗抹於紗布上，再覆蓋於患部。

### 【使用上的注意事項】

1. 有下列情況者，在使用本藥前，應請教醫師或藥師  
(1) 罹患出血性血液疾病者(血友病、血小板減少症、紫斑病等)。  
(2) 被推斷雖少量出血亦會造成嚴重後果者。
2. 使用本藥時，請注意下列事項  
(1) 避免直接塗抹於潰瘍或糜爛的患部。  
(2) 勿使用於眼部。
3. 保管及放置的注意事項  
(1) 存放在小孩拿不到的地方。  
(2) 存放在不受陽光直射的陰涼處所，使用後應立刻旋緊蓋子。