治 感 冒 液

衛署藥製字第035949號

Chin Common Cold Solution

【成分】有效成分及含量：每 ml 中含有下列成分：

Acetaminophen……15mg	dl-Methylephedrine Hydrochloride……0.48mg
Chlorpheniramine Maleate……0.21mg	Potassium Guaiacolsulfonate…… 3mg
Carbetapentane Citrate……0.48mg	Caffeine anhydrous……1.8mg

其他成分(賦形劑)：Sucrose、Saccharin Sodium、Sodium Dehydroacetate、Caramel、Cassia Oil、New Coccin、Pineapple Essence、Champine-Cyder、DL-Malic Acid、Sorbitol、Ethanol(95%)、Purified Water。

【用途(適應症)】緩解感冒之各種症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咳嗽、喀痰、咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛)

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1. 12歲以下。
2. 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
3. 吸煙、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
4. 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
5. 有心臟病及65歲以上的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2. 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
3. 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
4. 服用鎮靜藥或安眠藥的人。

四、其他使用上注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 勿超過建議使用量。
4. 使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
5. 不要服用本藥超過七日。
6. 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
7. 酒精警語:不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen(Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。
8. 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
9. 避免再服用含咖啡因藥品、飲料(如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

年齡	每次用量
成人	10ml
15-11歲	5ml
11-8歲	2.5ml

年齡	每次用量
8-5歲	6.6ml
5-3歲	3.3ml
3-2歲	2ml

一日3次，於飯後30分鐘以內服用，容器附有刻度。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮　　膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其　　他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有任何不適情況產生。
2. 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
3. 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
4. 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
5. 服用過量〔每日超過Acetaminophen4,000毫克(mg)〕，或服藥後出現下列症狀:胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
6. 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】10~4000毫升玻璃瓶裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存條件】儲存於25℃以下。

經　銷　商：立國藥品股份有限公司
地　　址：彰化市建國北路127號
藥商、製造廠：依必朗化學製藥股份有限公司
地　　址：彰化縣福興鄉福工路11號