衛署藥製字第 036332 號
GMP G-3519

"黃氏"

循克滴劑9.6毫克/毫升 (銀杏葉類黃酮配醣體) (橘子口味)

GIKO DROPS 9.6MG/ML "H.S."(GINKGOFLAVONGLYCOSIDES)

【藥理特性及說明】

本藥品的主成分為銀杏葉萃取物，根據德國科學家(Dr.Willmar Schwabe)的研究，銀杏所含之銀杏類黃酮配醣體(Ginkgo flavone glycosides)可以清除自由基、微量增加前列腺環素(PGI_2)的生理活性，銀杏內酯(Ginkgolides)會跟血小板活化因子(PAF)競爭與受體結合，拮抗 PAF 的生理活性，因而可能能夠輔助改善末梢微細血管的功能，供應充足的血氧和必須的能量物質給組織器官的細胞，幫助組織器官的生理功能得以正常運作。

【成　分】Each ml contains：

有效成分及含量：每 20 滴(=1ml)含有銀杏葉萃取物(Ginkgo biloba leaves extract)40mg，其中含 Ginkgo flavone glycosides 9.6mg(Quercetin，Kaempferol，Isorhamnetin)，Terpene lactones 2.4mg(Ginkgolides 1.24mg，Bilobalide 1.16mg)。

其他成分(賦形劑)：左旋精氨酸(L-Arginine)、刺五加抽出物(Russia Ginseng Extract)、Propylene Glycol、Glycerine、Sodium Saccharin、Caramel、Citric Acid、Methyl Paraben、Propyl Paraben、Orange Essence、Alcohol 95%、Purified Water。

【用途(適應症)】：末梢血行障礙之輔助治療。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

(一)對銀杏葉萃取物或本藥成分過敏的人。

(二)近期將進行手術：因可能增加手術出血之風險。

(三)懷孕或哺乳婦女。

(四)12歲以下。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一)癲癇病人：建議避免使用本藥，因本藥可能會誘發癲癇的發作。

(二)正在使用抗凝血劑、抗血小板藥品、非類固醇類抗發炎止痛劑：可能因藥物交互作用而發生不良反應之風險。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：正在使用任何藥品，包括不是經醫師處方之藥品。

四、其他使用上注意事項：

(一)如有必須進行手術，請務必告訴醫師正在服用本藥，並在手術前七天停止使用。

(二)月經期間請停止服用本藥品。

(三)使用本品前，應先確認症狀是否由需要其他治療之疾病引起。

(四)如果忘記服用或服用的劑量不夠時，請依照【用法用量】的指示方法繼續服用。

(五)因個人體質不同，個別病患服用本藥後之療效反應可能有所差異，無法盡如預期。

(六)請務必遵照【用法用量】的指示方法服用，否則可能無法達到預期的療效。如有必要，請由醫師指示其他的用法用量。

(七)服用本藥品時請與溫開水一起服用。

(八)為防止兒童誤食請妥善保管。

【用法用量】

年齡	一次用量	一日服用次數
12 歲以上	20 滴，於飯前或飯後服用	早、中、晚各一次

【警語】

服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

部位	症狀
胃腸道	**胃腸道不適：如腹瀉、腹痛、噁心和嘔吐，亦可能出現嚴重之不良反應。**
凝血系統	**器官出血：如眼睛、鼻子。 腦出血：如劇烈頭痛、噁心、嘔吐、意識變差。 胃腸道出血：如吐血、黑便、血便。**
皮膚	**過敏性反應：如紅斑、皮疹、水腫、搔癢。**
全身性反應	**過敏性休克：昏倒、意識不清。**

【包裝】6~4000 毫升玻璃瓶裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存】25℃以下儲存。

® PIC/S GMP 藥廠
SINCE 1961 黃氏製藥股份有限公司 L-18
雲林縣斗南鎮大同路444巷11號