“瑞 安” 美 胃 適 懸浮液 108 毫克/毫升

（ 氫 氧 化 鋁 鎂 ）

“Purzer” Magacid Suspension 108 mg/mL

(M a g a l d r a t e)

瑞安大藥廠股份有限公司 PURZER PHARMACEUTICAL CO., LTD.

PIC/S GMP 衛署藥製字第 036533 號 GMP 優良藥品 G-3641 號

醫師藥師藥劑生指示藥

緩衝制酸劑 Magaldrate 是 $AI(OH)_3$ 和 $Mg(OH)_2$ 的化合物，以緩衝的原理調整胃液於 pH 3~5 之間，所以無反激性胃酸和鹼化作用。

【成 分】

每 mL 含：

Magaldrate.....108 mg

賦形劑：Glycerin, Sodium Benzoate, Saccharin Sodium, Sorbitol Solution, Caramel Flavor, Cream Flavor, Xanthan Gum

中和酸能力：本品每單次劑量(5 mL)之酸中和能力不少於 12.18 mEq，鎂含量為 9.84mEq。

【適 應 症】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃或十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【用法用量】

一天 3 至 4 次，飯後 1 小時及睡前或需要時服用，成人每次 5 mL，使用前請搖勻。

12 歲以上適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，適用成人劑量之 1/2；3 歲以上未滿 6 歲；適用成人劑量之 1/4；3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

【注意事項】

1. **為防止兒童誤食請妥善保管。**
2. **避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。**
3. **除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行服用。**
4. **勿超過建議劑量，若有不適情況發生，應立即停藥就醫。**
5. **使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。**
6. **腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis Encephalopathy)及低磷血症、應謹慎小心使用。**

【警語】

1. **除非有醫師藥師藥劑生指示，對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過 5 g。**
2. **除非有醫師藥師藥劑生指示，未滿 3 個月之嬰兒不得服用。**
3. **除非有醫師藥師藥劑生指示，一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。**
4. **除非有醫師藥師藥劑生指示，制酸劑不得併用其他藥品。**
5. **如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。**
6. **消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。**
7. **本藥含鋁之制酸成分可能引起便秘，偶有噁心、嘔吐。**
8. **本藥含鎂之制酸成分可能引起腹瀉。**

【儲存條件】

請存放於室溫 30℃以下陰涼處所。

【包裝種類】

4000 毫升以下塑膠瓶裝。

瑞 安 大 藥 廠 股 份 有 限 公 司
地 址：台北市松山區光復南路 1 號 12 樓之 2
製 造 廠：瑞安大藥廠股份有限公司觀音廠
廠 址：桃園市觀音區草漯里大同一路 26 號
服務電話：(02)2766-0887