綜合感冒緩解劑　　衛署藥製字第 036594 G-3665 號

安安感冒加強液

An An Anticold Intense Solution

【成 分】**有效成分及含量：每1ml中含有**

Acetaminophen.....**15mg**
Chlorpheniramine Maleate.....**0.125mg**
DL-Methylephedrine HCl.....**0.5mg**
Potassium Guaiacolsulfonate.....**4mg**
Caffeine Anhydrous.....**2.5mg**
Dextromethorphan Hydrobromide.....**0.75mg**

其他成分(賦形劑)

當歸口味：Glycyrrhiza Extract、Sodium Dehydroacetate、Caramel、Sucrose、Ethanol、Cassia Oil、Ginger Oil、Carrot Essence、Propylene Glycol、Purified Water

柑橘口味：Glycyrrhiza Extract、Sodium Dehydroacetate、Food Color Yellow No.5、Sucrose、Ethanol、Orange Oil、Propylene Glycol、Purified Water

【用途(適應症)】緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、咯痰、發燒、頭痛、畏寒、關節痛、肌肉酸痛)。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：
(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
(二) 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑(SSRI)的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
(一) 12歲以下。
(二) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
(三) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
(四) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
(五) 有心臟病及65歲以上的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
(一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
(二) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
(三) 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
(四) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。

四、其他使用上注意事項：
(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
(二) 避免陽光直射。
(三) 勿超過建議使用量。
(四) 使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
(五) 不要服用本藥超過七日。
(六) 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
(七) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen(Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。
(八) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
(九) 不得與酒精性飲料併用。
(十) 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心博過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

年齡	每日使用量
成人及12歲以上	1日3次，每次10ml

【警 語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
(一) 若有任何不適情況產生。
(二) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
(三) 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
(四) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
(五) 服用過量【每日超過Acetaminophen4,000毫克(mg)】，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
(六) 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包　裝】10-4000毫升玻璃瓶裝。

【儲存條件】25°C以下。

【類　別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

美西製藥有限公司
PIC/S GMP 高雄市仁武區仁武里工業一路九號