衛署藥製字第 036752 號

"明德"康麗軟膏

Conlex Ointment "MEIDER"

本藥具有抗炎、抗菌作用更能防止感染發炎，為皮膚科、外科之理想用藥。所包含的成分作用如下：

Centella asiatica triterpenes	調節分佈人體內各細胞、組織及器官間的結締組織(特別是成纖維細胞)，促使受傷部位癒合迅速，傷疤平整。
Hydrocortisone	類固醇成分，具抗炎、止癢、抗過敏作用。
Neomycin	廣效抗生素，有局部抗菌的作用，可防止傷口感染發炎

【成分】**有效成分及含量：**Each gm contains

Centella asiatica triterpenes…… 10 mg

Hydrocortisone acetate…… 10 mg

Neomycin (equ.To Neomycin sulfate 4.5mg)…… 3.5 mg

其他成分（賦形劑）:Propylene Glycol、Polyethylene Glycol 400、Liquid Paraffin、Span 60、Tween 60、Vaselin 、Methly Paraben、Fragrance

【用途(適應症)】癢疹、癤瘡、疱疹、濕疹、膿疱炎。

【使用上注意事項】

一、 有下列情形者，請勿使用：

1. 曾因本藥成分引起過敏的人。

二、 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1. 有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。

2. 3 歲以下。

三、 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1. 兒童、孕婦可能懷孕婦女及哺乳婦。

2. 要使用於臉部。

四、 其他使用上注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。

2. 避免陽光直射。

3. 勿超過建議使用量或使用次數。

4. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

5. 本藥限於皮膚外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)，潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。

6. 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

7. 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

8. 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。

9. 請勿使用在患部以外，也勿當作預防使用。

10. 本藥不可連續使用超過 7 天。

11. 皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。

12. 小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。

13. 臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。

14. 癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。

15. 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。

【用法用量】將軟膏擠出少量，經擦於患部，每日 1～3 次，直至傷口痊癒為止。

【警語】

一、 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	**副作用**
皮膚	**發疹等過敏性皮膚炎。** **搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、痱子、毛細管擴張等。**
耳朵	**耳毒性**
腎臟	**腎毒性**
全身性	**庫欣氏症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)。繼發性腎上腺功能不足(如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。**

二、 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有上述外之其他不適情況產生。

2. 使用 7 天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】100 公克以下鋁軟管裝，塑膠瓶裝。

【儲存】儲存於 25℃以下。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

明德製藥股份有限公司

桃園市楊梅區民富路二段 360 號

MADE IN TAIWAN