



自古迄今，感冒等呼吸道疾病的症狀經常困擾著人們，例如：咳嗽、痰多、鼻塞、流鼻水及打噴嚏等，當令人感到非常不舒服。本藥為綜合感冒藥，兼具支氣管擴張、祛痰以及抗組織胺等多重作用，可以同時迅速緩解支氣管痙攣、咯痰、鼻塞、流鼻水以及打噴嚏等症狀。

【作用】

成分	作用
Orciprenaline Sulfate	對於支氣管平滑肌有抗痙攣作用，而能緩解咳嗽症狀。
Bromhexine Hydrochloride	從植物抽取而成，可以溶解體痰，使得痰液更容易被排出。
Doxylamine Succinate	抗組織胺藥品，可以緩解過敏引起的鼻塞、流鼻水及打噴嚏等症狀。

【成分及含量】 每mL含：Orciprenaline Sulfate.....0.5mg

Bromhexine Hydrochloride.....0.8mg

Doxylamine Succinate.....0.75mg

其他成分（賦形劑）：Sugar、Sodium Metabisulfite、Sodium Benzoate、Hydrochloric Acid (36%)、Propylene Glycol、Pineapple 4、Tartazine、Brilliant Blue FCF、Water Purified。

【用途（適應症）】 咳嗽、支氣管炎及感冒等所誘發之咳嗽、咯痰、鼻塞、流鼻水及打噴嚏。

【使用上注意事項】

一、對因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1. 6歲以下。
2. 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
3. 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病（如慢性支氣管炎或肺氣腫）所引起之持續或慢性咳嗽的人。

4. 腎功能不全，及可能引起排尿困難，及digitalis中毒之患者。
5. 有呼吸系統疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人。

6. 有使用下列藥品的人：Epinephrine, Isoproterenol等其他之Catecholamine製劑。
7. 65歲以上。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1. 孕婦、可能懷孕者及哺乳婦。

2. 正在服用其他綜合感冒藥。

3. 服用鎮靜藥或安眠藥的人。

四、其他使用上注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。

2. 避免陽光直射。

3. 別超過建議使用量。

4. 別用前須搖搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。

5. 不要服用本藥超過七日。

6. 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

7. 不得與酒類性飲料併用。

8. 請在有效期限內使用。

【用量】

年齡	使用量
14歲以上	每次10mL，一日三次
6歲以上未滿14歲	每次5mL，一日三~四次
1歲以上未滿6歲	每次5mL，一日二~三次
未滿6個月	每次5mL，一日二次

【警語】 一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振、腹痛
神經系統	頭痛、顫抖、睡不著、發汗、頭暈、耳鳴
其他	心跳加速、喉嚨痙攣、排尿困難、視覺模糊、血壓變動、顏面潮紅、蒼白

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
1. 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、皮疹或其它皮膚過敏、發燒、發癢，罕有出血、疲倦或虛弱及呼吸困難。
2. 偶有口腔、喉嚨、罕有出氣，可能會引起心跳不規則或是心跳停止的狀況。
3. 潛瘻過度，可能有高燒、體熱、參子或特異性頭痛。
4. 若有任何不適情況產生。
5. 咳嗽持續一星期以上，或有高燒、體熱、參子或特異性頭痛。
6. 症狀沒有改善，或症狀還併隨有高燒、頭痛、或發燒持續三日。
7. 喉嚨痙攣持續兩日以上並有高燒、頭痛、體熱或嘔吐。

【包裝】

60~4000毫升玻璃瓶裝、塑膠瓶裝。
【儲存條件】 放25°C以下、避光儲存。

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品。



永信藥品工業有限公司
YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號
電話：(04) 26875100
台中幼獅廠：台中市大甲區南里工業路27號

2145731