衛署藥製第 037187 號
GMP・G-3987

恩-福新乳膏
Neo-Fluocin Cream

【作　　用】
1. 本劑含局部類固醇類製劑，具有抗癢及血管收縮的作用。
2. 本劑可由皮膚接觸而吸收。

【成　　分】Each gm contains：

有效成分及含量:Fluocinolone Acetonide……..…0.25mg
Neomycin Sulfate (Potency)……..3.50mg

其他成分(賦形劑)：(有香料) Cetyl Alcohol, Mineral Oil, Isopropyl Myristate, Cream Base Wax, Polyoxyethylene (25) Cetyl Ether, Glyceryl Monostearate, Methyl Paraben, Perfume Sakura,Purified Water.

其他成分(賦形劑)：(無香料) Cetyl Alcohol, Mineral Oil, Isopropyl Myristate, Cream Base Wax, Polyoxyethylene (25) Cetyl Ether, Glyceryl Monostearate, Methyl Paraben, Purified Water.

【用途(適應症)】

濕疹或皮膚炎、急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用
1.對藥物各成分過敏的人。
二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治
1.類固醇抗發炎劑連續使用超過二星期。
三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師、藥師或藥劑生
1.兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2.使用於眼睛內或眼睛四周或黏膜。
3.使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
4.使用皮膚外用藥後覆蓋。
四、其他使用上注意事項
1. 位防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 勿超過建議使用量或使用次數。
4. 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
5. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
6. 本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
7. 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

8. 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
9. 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
10. 請勿使用在患部以外，也勿當作預防使用。
11. 本藥不可連續使用超過 7 天。
12. 皮膚的黴菌感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。
13. 小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
14. 臉部、腋下及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
15. 癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。

【用法用量】2-4 次/天，塗於患部。

【警　　語】

一、使用本藥後，若發生下列副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師、藥師或藥劑生。

身體部位	副作用
皮膚	過敏性皮膚炎、繼發性感染。
局部性	搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、痱子、毛細管擴張
全身性	庫欣式症候群（Cushing's syndrome，如滿月臉，體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等）、繼發性腎上腺功能不足（secondary adrenal insufficiency，如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等）、繼發性感染、可逆性的下視丘-腦下垂體-腎上腺抑制出現 Cushing's 症狀及高血糖和葡萄尿出現。
臉部、腋部及鼠蹊部	長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮
其他	衣物染色、耳及腎毒性、對 Neomycin 有抵抗性的細菌過度繁殖

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
1.使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。

【包　　裝】100 公克以下塑膠瓶及鋁軟管裝。
【類　　別】醫師藥師藥劑生指示藥品。
【儲　　存】請儲存於 30℃ 以下。

壽元化學工業股份有限公司
嘉義市新民路 128 號