局部止痛劑

"美時"

刻定痛 乳膏0.75公絲/公克

Capderm Cream 0.75mg/gm "M.S."(Capsaicin)

衛署藥製字第037359號G-4072

Capsaicin為一天然植物(Solanaceae科)之抽取物，化學名為trans-8-methyl-N-塜vanillyl-6-nonenamide，其性狀為白色結晶粉末，分子量305.4，幾不溶於水；極易溶於酒精、乙醇與氯仿中。

「成份」: Each gm contains:

Capsaicin 0.75mg(0.075%)

「作用」:

Capsaicin確實之作用機轉雖尚未完全明瞭，現有之證據指出Capsaicin經由耗盡周邊感覺神經元中的Substance P並防止其再度聚積而達到鈍化皮膚與關節痛感之效果。Substance P被認為是將痛感之衝動從周邊傳遞至中樞神經之主要化學介質，同時也是被釋放於關節組織，活化發炎介質與類風濕性關節炎病變有關的物質。

「適應症」:

風濕痛、神經痛、腰酸背痛、坐骨神經痛、肌肉痛。

「注意」:

1.本乳膏僅限於外用。避免接觸到眼睛、傷口、或敏感性皮膚。勿使用繃帶密封之。使用後，如發生症狀惡化，或使用期間長達28天仍未見改善則停藥並請教醫師。置於兒童不易取得之處，若不慎誤食則應立即送醫。

2.局部塗敷時，使用部份可能產生熱感、刺痛或灼燙感，(尤以用藥最初數日較常發生)，此現象乃與Capsaicin本身之藥理作用有關，通常數日內即會消失。

3.對於疱疹性神經痛的治療須於傷口癒合後才可使用

「用法用量」:

1.成人及兩歲以上兒童，每日局部適量塗敷3~4次。

2.少於每日3~4次之使用方式可能無法達到理想之疼痛解除效果;同時灼熱感也易持續較久。

3.使用乳膏之後宜洗手。(避開塗敷部位)指示用藥。

「包裝」:

1000公克以下軟管、塑膠瓶裝。

「貯存」:

室溫15-30。C貯存。

GMP藥廠
美時化學製藥股份有限公司
南投縣南投市南崗工業區成功一路30號