“仙台” 胃佳寧錠 10公絲

Oxethazaine Tables “Sentai”（歐希拉因）

治療胃炎，向來以飲食療法為中心，併用制酸劑、粘膜保護劑的方法，但對於胃痛、嘔吐、胸悶、噁心等主訴緊迫症狀卻不易顯效。

Oxethazaine 為表面麻醉劑，不但可除去胃痛感，且可抑制胃液分泌過剩以及胃運動機能異常亢進，對平滑肌有抗痙攣作用。

【成份】每錠含有

【主成分】Oxethazaine 10mg

【賦形劑】Lactose、Potato Starch、Polyvinylpyrrolidone k30、Alcohol(95%)、Magnesium stearate、Talc

【特長及作用】

解除急性胃炎症狀（但是低酸性，以及無酸性胃炎則例外）：

可除去由胃炎引起的胃痛、噁心、胃灼熱（吞酸、嘈雜），胃不快感，且可抑制胃機能的異常亢進。

【適應症】

胃炎、腸炎、食道癌所伴隨之胃痛、胃酸過多、胃部不適或灼熱感。

【用法用量】

一天 3 至 4 次，飯前 15 分鐘及就寢前或需要時服用。

成人每次 1 錠，12 歲以上適用成人劑量。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【警語】

1.有些病人可能對 Oxethazaine 過敏偶有過敏現象。過敏症狀如：皮膚發疹、搔癢症、舌炎、血管水腫。

2.Oxethazaine 服用過量，有些病人可能會有眩暈昏厥，嗜睡的情形。

3.含 Oxethazaine 之胃腸製劑，只建議在成人使用，孕婦、授乳婦及未滿 12 歲小孩不建議使用。

注意事項：

1.禁忌：對本藥過去有過敏現象者。

2.副作用：a.過敏症：使用本藥，若有發疹之過敏症反應時，應停止使用。

b.消化器：若有食慾不振，噁心、口渴、便秘、下痢等胃腸胃腸障害時，應減量服用或中止服用。精神神經系：偶而會有頭痛、失眠、眩暈、脫力感等現象發生。

3.本藥應避免長期連續服用，服用時整粒吞下，不要咬碎。

4.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

5.除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

6.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【包裝】

6～1000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 037519 號

G–4134

仙台藥品工業股份有限公司

台南市新營區新工路 35 號