

—“黃氏”—

# 艾翠麗 凝膠0.06% (氫偶素)

Estrad gel 0.06% "H.S." (Estradiol)

【成份】 Each gm contains :

Estradiol..... 0.6mg

【賦形劑】

Alcohol 95%、Lubra jel-CG、Bouquet、Water Purified。

【藥理作用】

艾翠麗凝膠為經皮膚吸收之Estrogen治療劑，能提供體內由卵巢天然分泌之 $17\beta$ -estradiol，同時並能避免在肝臟之過度蓄積，主要用於治療停經及停經後所產生的症狀。

【藥品動力學】

Estradiol可迅速由皮膚吸收，約有50%與血漿蛋白結合，主要由肝臟代謝，並以其sulphate或Glucoronide ester與少量未經代謝的Estradiol由尿液排泄。

【適應症】

因停經引起之血管異常、因卵巢分泌障礙所致之萎縮（如陰道萎縮、女陰乾皺、女性生殖腺功能不足、卵巢切除患者、原發性卵巢功能障礙）。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

通常建議用量為每日2.5gm（一劑量尺或一包）連續使用三週，停用一週而且併用口服progesterone製劑10天（第10至21天）。於停用的一週中通常可見出血現象。

【使用方法】

艾翠麗凝膠應於清洗後使用於小腹上。大腿內側、頸部兩側和肩胛部份亦可施用。應避免接觸黏膜。

【注意事項】

婦女在治療時，會有過量激素的反應，須在劑量上做一個縮減如：兩側的乳房炎、易怒、好鬥性、煩躁不安、體重增加、喪失白血球、臉部有色素沈著的斑點。

禁忌症：  
1. 乳房及子宮惡性腫瘤者。  
2. 垂體的腫瘤者。  
3. 曾使用雌激素引起糖尿病，高血壓病等血管疾病危險增加者。

△過量情況：

1. 乳房有疼痛感。
2. 腹骨盆的膨脹。
3. 憂慮、煩躁、好鬥性。

【包裝】

2.5公克/鋁箔包，400包以下裝；1000公克以下管裝。