

雙豹止痛錠

Shuanpao Chitung Tablets

【成分】 Each tablet Contains:

| | |
|--------------------------|--------|
| Ethenzamide | 400 mg |
| Acetaminophen | 160 mg |
| Caffeine anhydrous | 50 mg |
| Bromvalerylurea | 150 mg |

【賦形劑】 Microcrystalline Cellulose, Polyvinylpyrrolidon, Magnesium Stearate

【適應症】 解熱、鎮痛(頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉痛、月經痛)。

【用法用量】 一天三次，成人(15歲以上)一次一錠，11~14歲 2/3錠，8~10歲 1/2錠，飯後服用。
指示藥品。

- 【注意事項】**
- 一.本劑含有劇藥，應切實按照所定服用方法及劑量使用。
 - 二.在就診中上使用上使用其他解熱、鎮痛或感冒藥者應避免重複使用。
 - 三.應用本劑數次仍未見症狀改善時，應即停用。
 - 四.避免長期服用。
 - 五.本劑應置於小孩伸手不及處。

【警語】 本藥含抗acetaminophen成分，應注意下列事項：

(一) 肝毒性：

- (1)使用 acetaminophen (paracetamol) 曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日4,000 毫克的 acetaminophen 所致，且多涉及使用超過一種以上含 acetaminophen 成分之藥品。
- (2)過量服用 acetaminophen 可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有 acetaminophen 成分之藥品，因而造成用藥過量。
- (3)有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用 acetaminophen 期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含 acetaminophen 或 paracetamol 成分，不可同時使用超過一種以上含有 acetaminophen 成分之藥品。如果一天誤服超過4,000 毫克 acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。

- (二) 與酒精併用：不得併服含酒精飲料，因為 acetaminophen 可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用 acetaminophen 而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。

(三) 過量：

- (1)服用過量 acetaminophen 會在服藥24小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。
- (2)本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。
- (3)Acetaminophen 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後48~72小時才明顯可見。
- (四) 過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用acetaminophen 相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。會對 acetaminophen 過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。
- (五) 嚴重皮膚反應：使用acetaminophen 的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿疱病 (Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)、史蒂文生氏-強生症候群 (Stevens-Johnson Syndrome, SJS) 和毒性表皮壞死溶解症 (Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)。
。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

【包裝規格】 6~1000 錠瓶裝

衛署藥製字第 038140 號

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號