“長安” 止痛錠

（鳳梨口味）

Chihtung Tablets "C.A."

【成　　分】 Each tablet Contains：

有效成分及含量 Ethenzamide ……345 mg
Acetaminophen ……160 mg
Caffeine anhydrous……100 mg
Bromvalerylurea ……100 mg

其他成分(賦形劑)　Sodium Starch Glycolate, Silicon Dioxide Colloidal, Polyvinylpyrrolidon, Magnesium Stearate, Pineapple Flavor, Purified Water

【用途(適應症)】解熱、鎮痛 (頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉痛、月經痛)。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：
（一）曾因本藥成分引起過敏的人。
（二）有蠶豆症的人。
（三）懷孕 28 週以上的婦女
（四）18 歲以下之水痘或流行性感冒症狀之解除，因可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
（一）成人連續服用本藥超過 7 天，12 歲以下小孩超過 3 天，症狀未緩解的人。
（二）有消化性潰瘍或正使用抗凝血劑的人。
（三）12 歲以下。
（四）有肝臟疾病的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
（一）孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
（二）曾有消化性潰瘍的人。
（三）同時服用含 Acetaminophen 成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

四、其他使用上注意事項：
（一）為防止兒童誤食請妥善保管。
（二）避免陽光直射。
（三）勿超過建議使用量。
（四）服用過量的 Acetaminophen 可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 Acetaminophen 成分的藥品，但是每天服用 Acetaminophen 超過 4,000 毫克(mg)會發生肝臟損害。
（五）酒精警語：不得併服含酒精飲料，有急性肝衰竭及胃出血的風險。
（六）避免再服用含咖啡因藥品、飲品，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

年齡	劑量	用法
成人(15 歲以上)	每次 1 錠	一日二次，飯後服用
8 歲~11 歲	每次 1/2 錠	

【警　　語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說 明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振、胃腸不適、 胃腸出血
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	出血傾向、氣喘。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
（一）若有任何不適情況產生。
（二）服用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。
（三）服用過量(每日超過 Acetaminophen 4,000毫克(mg)或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
（四）有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包　　裝】4-1000錠鋁箔盒裝
【類　　別】醫師藥師藥劑生指示藥品
【儲存條件】25℃以下避光儲存
衛署藥製字第 038325 號

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉萬豐村福工路 19 號、19-1 號

“長安” 止痛錠

（人參口味）

Chihtung Tablets "C.A."

【成　　分】 Each tablet Contains：

有效成分及含量 Ethenzamide ……345 mg
Acetaminophen ……160 mg
Caffeine anhydrous……100 mg
Bromvalerylurea ……100 mg

其他成分(賦形劑)　Sodium Starch Glycolate, Silicon Dioxide Colloidal, Polyvinylpyrrolidon, Magnesium Stearate, Ginseng Flavor, Purified Water

【用途(適應症)】解熱、鎮痛 (頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉痛、月經痛)。。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：
（一）曾因本藥成分引起過敏的人。
（二）有蠶豆症的人。
（三）懷孕 28 週以上的婦女
（四）18 歲以下之水痘或流行性感冒症狀之解除，因可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
（一）成人連續服用本藥超過 7 天，12 歲以下小孩超過 3 天，症狀未緩解的人。
（二）有消化性潰瘍或正使用抗凝血劑的人。
（三）12 歲以下。
（四）有肝臟疾病的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
（一）孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
（二）曾有消化性潰瘍的人。
（三）同時服用含 Acetaminophen 成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

四、其他使用上注意事項：
（一）為防止兒童誤食請妥善保管。
（二）避免陽光直射。
（三）勿超過建議使用量。
（四）服用過量的 Acetaminophen 可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 Acetaminophen 成分的藥品，但是每天服用 Acetaminophen 超過 4,000 毫克(mg)會發生肝臟損害。
（五）酒精警語：不得併服含酒精飲料，有急性肝衰竭及胃出血的風險。
（六）避免再服用含咖啡因藥品、飲品，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

年齡	劑量	用法
成人(15 歲以上)	每次 1 錠	一日二次，飯後服用
8 歲~11 歲	每次 1/2 錠	

【警　　語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說 明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振、胃腸不適、 胃腸出血
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	出血傾向、氣喘。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
（一）若有任何不適情況產生。
（二）服用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。
（三）服用過量(每日超過 Acetaminophen 4,000毫克(mg)]或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
（四）有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包　　裝】4-1000錠鋁箔盒裝
【類　　別】醫師藥師藥劑生指示藥品
【儲存條件】25℃以下避光儲存
衛署藥製字第 038325 號

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉萬豐村福工路 19 號、19-1 號

長安" 止痛 錠 （草莓口味）

Chihtung Tablets "C.A."

【成　　分】 Each tablet Contains：

有效成分及含量 Ethenzamide ……345 mg
Acetaminophen ……160 mg
Caffeine anhydrous……100 mg
Bromvalerylurea ……100 mg

其他成分(賦形劑)　Sodium Starch Glycolate, Silicon Dioxide Colloidal, Polyvinylpyrrolidon, Magnesium Stearate, Strawberry Flavor, Purified Water

【用途(適應症)】解熱、鎮痛 (頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉痛、月經痛)。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：
（一）曾因本藥成分引起過敏的人。
（二）有蠶豆症的人。
（三）懷孕 28 週以上的婦女
（四）18 歲以下之水痘或流行性感冒症狀之解除，因可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
（一）成人連續服用本藥超過 7 天，12 歲以下小孩超過 3 天，症狀未緩解的人。
（二）有消化性潰瘍或正使用抗凝血劑的人。
（三）12 歲以下。
（四）有肝臟疾病的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
（一）孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
（二）曾有消化性潰瘍的人。
（三）同時服用含 Acetaminophen 成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

四、其他使用上注意事項：
（一）為防止兒童誤食請妥善保管。
（二）避免陽光直射。
（三）勿超過建議使用量。
（四）服用過量的 Acetaminophen 可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 Acetaminophen 成分的藥品，但是每天服用 Acetaminophen 超過 4,000 毫克(mg)會發生肝臟損害。
（五）酒精警語：不得併服含酒精飲料，有急性肝衰竭及胃出血的風險。
（六）避免再服用含咖啡因藥品、飲品，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

年齡	劑量	用法
成人(15 歲以上)	每次 1 錠	一日二次，飯後服用
8 歲~11 歲	每次 1/2 錠	

【警　　語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說 明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振、胃腸不適、 胃腸出血
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	出血傾向、氣喘。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
（一）若有任何不適情況產生。
（二）服用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。
（三）服用過量(每日超過 Acetaminophen 4,000毫克(mg)]或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
（四）有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包　　裝】4-1000錠鋁箔盒裝
【類　　別】醫師藥師藥劑生指示藥品
【儲存條件】25℃以下避光儲存
衛署藥製字第 038325 號

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉萬豐村福工路 19 號、19-1 號

“長安” 止痛錠

（香檳口味）

Chihtung Tablets "C.A."

【成　　分】 Each tablet Contains：

有效成分及含量 Ethenzamide ……345 mg
Acetaminophen ……160 mg
Caffeine anhydrous……100 mg
Bromvalerylurea ……100 mg

其他成分(賦形劑)　Sodium Starch Glycolate, Silicon Dioxide Colloidal, Polyvinylpyrrolidon, Magnesium Stearate, Champagne Flavor, Purified Water

【用途(適應症)】解熱、鎮痛 (頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉痛、月經痛)。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：
（一）曾因本藥成分引起過敏的人。
（二）有蠶豆症的人。
（三）懷孕 28 週以上的婦女
（四）18 歲以下之水痘或流行性感冒症狀之解除，因可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
（一）成人連續服用本藥超過 7 天，12 歲以下小孩超過 3 天，症狀未緩解的人。
（二）有消化性潰瘍或正使用抗凝血劑的人。
（三）12 歲以下。
（四）有肝臟疾病的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
（一）孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
（二）曾有消化性潰瘍的人。
（三）同時服用含 Acetaminophen 成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

四、其他使用上注意事項：
（一）為防止兒童誤食請妥善保管。
（二）避免陽光直射。
（三）勿超過建議使用量。
（四）服用過量的 Acetaminophen 可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 Acetaminophen 成分的藥品，但是每天服用 Acetaminophen 超過 4,000 毫克(mg)會發生肝臟損害。
（五）酒精警語：不得併服含酒精飲料，有急性肝衰竭及胃出血的風險。
（六）避免再服用含咖啡因藥品、飲品，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

年齡	劑量	用法
成人(15 歲以上)	每次 1 錠	一日二次，飯後服用
8 歲~11 歲	每次 1/2 錠	

【警　　語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說 明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振、胃腸不適、 胃腸出血
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	出血傾向、氣喘。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
（一）若有任何不適情況產生。
（二）服用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。
（三）服用過量(每日超過 Acetaminophen 4,000毫克(mg)]或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
（四）有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包　　裝】4-1000錠鋁箔盒裝
【類　　別】醫師藥師藥劑生指示藥品
【儲存條件】25℃以下避光儲存
衛署藥製字第 038325 號

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉萬豐村福工路 19 號、19-1 號

“長安” 止痛錠

（甜橙口味）

Chihtung Tablets "C.A."

【成　　分】 Each tablet Contains：

有效成分及含量 Ethenzamide ……345 mg
Acetaminophen ……160 mg
Caffeine anhydrous……100 mg
Bromvalerylurea ……100 mg

其他成分(賦形劑)　Sodium Starch Glycolate, Silicon Dioxide Colloidal, Polyvinylpyrrolidon, Magnesium Stearate, Orange Flavor, Purified Water

【用途(適應症)】解熱、鎮痛 (頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉痛、月經痛)。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：
（一）曾因本藥成分引起過敏的人。
（二）有蠶豆症的人。
（三）懷孕 28 週以上的婦女
（四）18 歲以下之水痘或流行性感冒症狀之解除，因可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
（一）成人連續服用本藥超過 7 天，12 歲以下小孩超過 3 天，症狀未緩解的人。
（二）有消化性潰瘍或正使用抗凝血劑的人。
（三）12 歲以下。
（四）有肝臟疾病的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
（一）孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
（二）曾有消化性潰瘍的人。
（三）同時服用含 Acetaminophen 成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

四、其他使用上注意事項：
（一）為防止兒童誤食請妥善保管。
（二）避免陽光直射。
（三）勿超過建議使用量。
（四）服用過量的 Acetaminophen 可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 Acetaminophen 成分的藥品，但是每天服用 Acetaminophen 超過 4,000 毫克(mg)會發生肝臟損害。
（五）酒精警語：不得併服含酒精飲料，有急性肝衰竭及胃出血的風險。
（六）避免再服用含咖啡因藥品、飲品，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

年齡	劑量	用法
成人(15 歲以上)	每次 1 錠	一日二次，飯後服用
8 歲~11 歲	每次 1/2 錠	

【警　　語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說 明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振、胃腸不適、 胃腸出血
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	出血傾向、氣喘。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
（一）若有任何不適情況產生。
（二）服用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。
（三）服用過量(每日超過 Acetaminophen 4,000毫克(mg)]或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
（四）有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包　　裝】4-1000錠鋁箔盒裝
【類　　別】醫師藥師藥劑生指示藥品
【儲存條件】25℃以下避光儲存
衛署藥製字第 038325 號

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉萬豐村福工路 19 號、19-1 號

“長安” 止痛錠

（葡萄口味）

Chihtung Tablets "C.A."

【成　　分】 Each tablet Contains：

有效成分及含量 Ethenzamide ……345 mg
Acetaminophen ……160 mg
Caffeine anhydrous……100 mg
Bromvalerylurea ……100 mg

其他成分(賦形劑)　Sodium Starch Glycolate, Silicon Dioxide Colloidal, Polyvinylpyrrolidon, Magnesium Stearate, Grape Flavour, Purified Water

【用途(適應症)】解熱、鎮痛 (頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉痛、月經痛)。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：
（一）曾因本藥成分引起過敏的人。
（二）有蠶豆症的人。
（三）懷孕 28 週以上的婦女
（四）18 歲以下之水痘或流行性感冒症狀之解除，因可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
（一）成人連續服用本藥超過 7 天，12 歲以下小孩超過 3 天，症狀未緩解的人。
（二）有消化性潰瘍或正使用抗凝血劑的人。
（三）12 歲以下。
（四）有肝臟疾病的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
（一）孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
（二）曾有消化性潰瘍的人。
（三）同時服用含 Acetaminophen 成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

四、其他使用上注意事項：
（一）為防止兒童誤食請妥善保管。
（二）避免陽光直射。
（三）勿超過建議使用量。
（四）服用過量的 Acetaminophen 可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 Acetaminophen 成分的藥品，但是每天服用 Acetaminophen 超過 4,000 毫克(mg)會發生肝臟損害。
（五）酒精警語：不得併服含酒精飲料，有急性肝衰竭及胃出血的風險。
（六）避免再服用含咖啡因藥品、飲品，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

年齡	劑量	用法
成人(15 歲以上)	每次 1 錠	一日二次，飯後服用
8 歲~11 歲	每次 1/2 錠	

【警　　語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說 明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振、胃腸不適、 胃腸出血
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	出血傾向、氣喘。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
（一）若有任何不適情況產生。
（二）服用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。
（三）服用過量(每日超過 Acetaminophen 4,000毫克(mg)]或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
（四）有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包　　裝】4-1000錠鋁箔盒裝
【類　　別】醫師藥師藥劑生指示藥品
【儲存條件】25℃以下避光儲存
衛署藥製字第 038325 號

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉萬豐村福工路 19 號、19-1 號