

優克樂 膠囊250毫克(西華克樂)

Uclor Capsules 250 mg (Cefaclor)

[成 份]

Each capsule Contains :

Cefaclor 250mg(potency)

[賦 形 劑]

Lactose、Glyceryl Behenate、Primojel、Magnesium Stearate、Aerosil Silicone Dioxide

[膠囊成份]

Gelatin、Titanium Dioxide、Brilliant Blue FCF、Erythrosine、Sodium Lauryl Sulfate

[藥理作用]

本品口服後，吸收良好，故給藥時，不必考慮進餐與否，進餐時服用，通常在服用後45分鐘至1小時，出現最高血中濃度，其值均為空腹時所得值的50%至70%。但消化道內食物的存在，並不會改變本品的總吸收量，空腹給藥250mg、500mg和1g之劑量，30分鐘至1小時之平均最高血清濃度各為7.13和23mg/L，8小時內有60%至85%以原型自尿中排泄，這期間，服用250mg、500mg和1g之Cefaclor後，其最高尿中濃度分為600,900和1900mg/L，正常人血清半衰期為0.6至0.9小時，對腎功能不良患者，Cefaclor的血清半衰期則略加長，對完全喪失腎功能患者，原型分子之生物半衰期為2.3至2.8小時，對顯著腎功能受損患者，排泄途徑尚未判定，血液透析可減短半衰期25%至30%。

衛署藥製字第038332號
G-4575

[適 應 痘]
甲族乙型溶血性鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌、奇異變形桿菌、克霍氏肺炎桿菌、嗜血桿菌、淋球菌等病原菌所引起的感染症。

[效 能]

Cefaclor用於治療下列感受性細菌引起之感染：

中耳炎：由肺炎鏈球菌(肺炎雙球菌)，流行性感冒嗜血桿菌、葡萄球菌、化膿性鏈球菌(甲、乙兩種溶血性鏈球菌)和墨拉克氏卡地菌引起。

下呼吸道感染：包括肺炎，由肺炎鏈球菌(肺炎雙球菌)，流行性感冒嗜血桿菌、化膿性鏈球菌(甲、乙兩種溶血性鏈球菌)和墨拉克氏卡他菌引起。

上呼吸道感染：包括咽炎和扁桃腺炎，由化膿性鏈球菌(甲、乙兩種溶血性鏈球菌)，和墨拉克氏卡他菌引起。

[用法用量]

口服，成人：每8小時250-500mg。孩童：一日劑量20mg-40mg/kg，分三次服用。依年齡症狀輕重增減之。本藥須由醫師處方使用。

[注意事項]

治療和預防鏈球菌的感染，包括風濕性熱的預防，通常選擇青黴素。美國心臟協會推薦使用Amoxicillin作為牙科，口腔和上呼吸道手術時，預防由甲型溶血性鏈球菌引起之細菌性心內膜炎之標準療法。

Penicillin V為選擇之替代藥物。而Cefaclor對於根除鼻咽部的鏈球菌感染通常都有效，然而對預防風濕性熱或細菌性心內膜炎的療效尚未確立。

泌尿道感染：包括腎盂腎炎和膀胱炎，由大腸桿菌，奇異變形桿菌，克霍氏桿菌和凝固酶陰性的葡萄球菌引起。

Cefaclor對急，慢性泌尿道感染都有效。皮膚和軟組織的感染：由金黃色葡萄球菌和化膿性鏈球菌(甲、乙兩種溶血性鏈球菌)引起。

淋球菌性尿道炎：應採取適當之細菌培養及感受性試驗，以確定病原體對Cefaclor之感受性。

[禁 忌]
Cefaclor禁用於對頭孢子菌素類抗生素有過敏性之患者。

[警 語]
在使用Cefaclor之前，應小心查詢患者曾否對Cefaclor，頭孢子菌素，青黴素或其他藥物產生過敏反應。假如此藥是要給予對青黴素過敏的病人時，應格外小心，因為乙型丙醯胺類抗生素之間發生交叉過敏性，包括嚴重過敏性反應，已有明確的報告證明。

如果病患對Cefaclor產生過敏反應，須停藥，必要時並給適當藥劑，如升壓藥，抗組織胺或皮

3

1

2

3

4

5

6

4

5

6

7

內有使用說明請由此打開

優克樂 膠囊250毫克(西華克樂)

Uclor Capsules 250 mg (Cefaclor)



4 715459 332041

衛署藥製字第038332號
G-4575

Each capsule contains:

Cefaclor..... 250 mg(potency)
1000'S

委託者：
新瑞生物科技股份有限公司
台南市新市區中山路182號

製造廠：
瑞士藥廠股份有限公司新市廠
台南市新市區中山路182號

引桿、大葡萄球菌引起之腸球菌乙型溶血性鏈球菌、淋病奈瑟菌、等桿變異性病菌、病原、形球菌所引起的感染症。

LOT:

EXP:

請詳閱說明書。

請詳閱說明書。