

“人人” 倍姿溶液 20 毫克/毫升 (紅絲菌素) Bezin Solution 20 mg/mL “GCPC” (Erythromycin)

衛署藥製字第 038350 號

GMP G-4576

【成分】

有效成分及含量

Each milliliter contains:

Erythromycin.....20 mg

其他成分(賦形劑)

Alcohol 95%、Glycerin、PVP K-30、Brilliant blue FCF、Tartrazine

【用途 (適應症)】

治療尋常性痤瘡。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

會因本藥成分引起過敏。

二、有下列情形者，請洽醫師診治：

1. 深部皮膚組織感染。
2. 12歲以下。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2. 正在使用其他外用痤瘡(青春痘、面皰)治療藥物或併用其他痤瘡輔助治療。

四、其他使用上注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 勿超過建議使用量或使用次數。
4. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
5. 本藥僅能使用於痤瘡(青春痘、面皰)部位，不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。
6. 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
7. 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
8. 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
9. 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
10. 使用前請使用於1~2個小區域，測試是否會對本藥過敏，若無刺激感發生，再使用本藥。

【用法用量】

於痤瘡部位每天早晚使用二次，使用前先將皮膚用溫水和肥皂清洗乾淨。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	皮膚乾燥、觸痛、發癢、落屑、發紅、油熱感。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有上述外之其他不適情況產生。
2. 同一部位使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。
3. 皮膚發生乾燥、脫皮、刺痛、燒灼感時，經降低使用次數或使用低濃度，刺激感未改善。

【包裝】

1000 毫升以下塑膠瓶裝、玻璃瓶裝。

【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥。

【儲存條件】

塑膠瓶裝請於 25°C 以下保存。

