十 全 藥 品

衛署藥製字第 038450 號

"十全"膿化清錠１００毫克

ACETIN TABLETS 100MG "S.C."

本劑有液化粘液作用，能將粘性及膿性分泌物及痰分解消除。

【成分】Each tablet contains：

有效成分及含量:

ACETYLCYSTEINE…… …100 mg

其它成分(賦型劑):

Lactose、Corn Starch、Silicon Dioxide、Polyvinyl Pyrrolidone (K 30)、Polyvinyl Pyrrolidone (K 90)、Magnesium Stearate、Talc、Orange Powder、Aspartame。

【用途(適應症)】

減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性。

【使用上注意事項】：

一、有下列情形者，請勿使用：

(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾(慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起的咳嗽及咳嗽有濃痰的人。

(二) 3 歲以下。

(三) 支氣管性氣喘及伴有呼吸功能不全的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二) 65 歲以上。

四、其他使用上注意事項：

(一) 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。

(二) 避免陽光直射。

(三) 勿超過建議使用量。

(四) 不得與含酒精飲料併用。

(五) 本藥會導致支氣管分泌物的增加，使用後應仔細觀察，如無法自行咳出，建議採用變換姿勢、拍痰或機械抽取等適當的處理步驟。

【用法用量】

年齡	劑量
成人及 12 歲以上	每次兩錠，一天三次。
6 歲以上未滿 12 歲	適用成人劑量之 1/2。
3 歲以上未滿 6 歲	適用成人劑量之 1/4。
3 歲以下	請洽醫師診治。

【警語】

- **服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：**

(一) 若有任何不適情形產生。

（二） 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上的咳嗽，或有復發情形

（三） 消化道：偶有噁心、嘔吐、食慾不振、輕微硫磺味臭氣溢出等不悅感。

偶有發疹等過敏症狀。

其他：偶有血痰、惡寒、發熱、鼻水流不停、口內炎症狀發生。

【包裝】12~1000 錠塑膠瓶裝。
【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品
【儲存】25℃以下儲存

十全實業股份有限公司

南投市南崗工業區仁和路 27 號

電　　話：(049)254221-3
服務專線：(049)2254615
訂購專線：0800-491666
電　　話：(049)2254617