

"生達" 雅露佳 懸浮液

Aluzaine Suspension "Standard"

胃炎或胃部疾患向來皆以飲食療法為主，再併用制酸劑、抗膽素劑、黏膜保護劑的方法收效雖佳，但對於胃痛、嘔吐、悶胸、噁心等主訴緊迫症狀卻不易顯效。

一般之局部麻醉劑，因其毒性強易生耐藥性，唯獨Oxethazaine為幾乎無此缺點之胃黏膜專用之局部麻醉劑，對於胃、十二指腸、食道等之發炎、潰瘍所引發之疼痛，均可快速緩解。同時又因本劑可迅速於胃中形成保護膜，可避免胃酸等刺激物再傷害消化道，預防再度出血及疼痛。

一般胃藥往往會導致便秘情形，而本劑同時加有Aluminum hydroxide及Magnesium hydroxide，除可有效中和胃酸、解除胃腸不適外，由於Magnesium hydroxide之輕瀉作用，所以不致會有便秘發生。

在學理上而言，雅露佳懸浮液誠為一優良配方之胃腸藥。

成份：每1ml含：

Oxethazaine.....	2.0mg
Aluminum hydroxide.....	61.2mg
Magnesium hydroxide.....	19.5mg

作用及特點：

1.解除急性胃炎症狀：

可除去由胃炎引起的胃痛、噁心、胃灼熱、胃不快感、嘔吐等症狀，且可抑制胃機能的異常亢進。

2.消去便意頻迫症狀：

胃痛時胃腸反射刺激亢進屢使便意頻繁，「雅露佳」懸浮液可緩和胃腸反射感度，改善便意頻迫症狀。

3.作用持續長久：

Oxethazaine主要作用於胃幽門前庭之神經末梢，使之麻醉以阻止胃腺所分泌之激素Gastrin游離，進而抑制胃酸之分泌。

其對黏膜的持續作用比Cocaine及Lignocaine長而強，不但可除去胃痛感，且可抑制胃液分泌過剩以及胃運動機能異常亢進，其對平滑肌亦有抗痙攣作用。Oxethazaine絕少被吸收，毒性極低，配合Aluminum hydroxide及Magnesium hydroxide，可形成一保護膜，具有持續性制酸效果，並可延續Oxethazaine之作用時間。

適應症：胃潰瘍、十二指腸潰瘍、食道炎。

用法用量：成人一天4次，每次5-10ml，飯前15分鐘及睡前服用。

服藥後請勿立即喝開水，以免減低藥效。

本藥須由醫師處方使用。

注意事項：1.使用前請搖勻，使用後蓋緊瓶蓋。

2.請勿過量服用。

3.請勿與tetracycline(四環素)及鐵鹽併服。

4.腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。

賦形劑：Sorbitol Solution 70%、Glycerin、Silicon Resin、Xanthan Gum、Sodium Phosphate Monobasic、Methylparaben、Propylparaben、Peppermint Oil、Menthol、Alcohol 95%、Hydrogen Peroxide、Water Purified

包裝：40-4000公撮塑膠瓶裝、盒裝。

衛署藥製字第038472號 G-4603 Code. No. LA-02 3214240



PIC/S GMP 藥廠
生達化學製藥股份有限公司 二廠
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台南市新營區開元路154號

S0407