〝晟德〞

可多芬膠囊

KETOPHEN CAPSULE

〝CENTER〞

GMP
衛署藥製字第 038844 號
G-4790

主成份：每膠囊含有
Ketoprofen…… 50mg

適應症：
風濕性關節炎、變形性關節炎、外傷及手術後的鎮痛消炎。

用法用量：
本藥須由醫師處方使用。
建議 1 日 3~6 粒分 3~4 次服用。
開始劑量每次 1 粒半，1 天 3 次，或每次 1 粒，1 天 4 次，依年齡、症狀、體重、性別，酌情遞減，一天量以不超過 6 粒為原則，超過 6 粒會出現胃腸障礙、頭痛。

禁忌：

1.消化性潰瘍患者。

2.重症之血液異常患者。

3.重症之肝障礙患者。

4.重症之腎臟礙患者。

5.重症之心機能不全患者。

6.對本劑過敏之患者。

7.患有阿斯匹靈氣喘或曾有該病歷之患者。

注意事項：(依文獻記載)

1.使用消炎鎮痛劑治療乃為對症療法，而非原因療法。

2.用於治療慢性疾患(慢性風濕性關節炎)時應考慮下列事項:

(1)長期投與時，須定期做臨床檢查(尿液檢查、血液檢查及肝機能檢查)，如發現有異現象，則須採取減量或停藥等適當措施。

(2)考慮採用非藥物治療法。

3.用於治療急性疾患時，應可慮下列事項:

(1)對於急性炎症，須考慮其病痛及發熱程度而給藥。

(2)原則上應避免長期使用同一類藥品。

(3)如有原因療法，則應採用。

4.須仔細觀察患者之狀況，留意有否副作用發生。可能出現過度體溫下降、虛脫、四肢冷卻等症狀，對患者有高燒之幼兒及高齡或消耗性疾患之患者，給藥後尤須注意觀察患者之狀況。

5.本劑可能會遮蔽感染症狀之顯現，因此用於仔細觀察，慎重投與。

6.儘量避免與其他非類固醇消炎鎮痛劑合併使用。

7.對小兒及高齡患者，尤須注意有否副作用出現，並以最低之有效劑量來慎重投與。

8.對下列患者須慎重投與:

(1)曾有消化性潰瘍病例之患者。

(2)患有血液異常或曾有此病例之患者。

(3)患有肝、腎障害或曾有該病歷之患者。

(4)心機能障害之病患。

(5)曾有過敏症病例之患者。

(6)支氣管氣喘之患者。

9.高齡者使用本劑偶有生理機能低下產生，應慎重投與，並注意劑量及投與間隔。

10. 孕婦及授乳婦使用本劑:

(1)動物實驗(鼠)於妊娠末期，胎兒動脈血管收縮。

(2)妊娠中及授乳中使用本劑，其安全性尚未確立故宜評估治療有益性或危險性，再投與本劑。

11. 幼兒使用本劑其安全性尚未確立。

副作用：(依文獻記載)

1.精神及神經系統:出現胸內苦悶、惡寒、冷汗、呼吸困難、四肢麻木感及血壓低下等，立刻停藥並作適當處置。

2.消化系統:出現消化性潰瘍，胃腸出血等，應立刻停藥，內服普通劑型，偶有食慾不振、消化不良、胃部不快感、胃痛、噁心、嘔吐、下痢、便秘、口渴、口內炎。

3.肝臟:可能使 GOT、GPT 值上升。

4.腎臟:可能出現腎變硬、萎縮腎症候群。

5.血液:可能會引起血色素量低下，顆粒球減少，白血球減少，血小板減少，故須作血液檢查並小心觀察，有異常狀況出現，必須立刻停藥。

6.皮膚: 可能會引起中毒性表皮壞死症(Lyell 症候群)故須小心觀察，有異常狀況出現必須立刻停藥。

7.過敏症: 可能會引起發疹、搔癢，故須小心觀察，有異常狀況出現須立刻停藥。

賦 形 劑：Lactose Fast-Flo 316、Croscarmellose Sodium、Colloidal Siloicon Dioxide、 Magnesium Stearate

包　　裝：
6~1000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝

儲　　存：
(1)本品應置於兒童不及之處。
(2)請密封儲存於 25℃以下，毋須冰存並避免陽光直射。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)
CENTER LABORATORIES INC.
地　　址：　臺北市南港區園區街 3 之 2 號 7 樓
晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)
廠　　址：　新竹縣湖口鄉實踐路 2 號
公司電話：　(02) 2655-8680　　圖文傳真：　(02) 2655-8380
工廠電話：　(03) 598-1829　　圖文傳真：　(03) 598-1820
CTRA-092 20190109