

(茉莉花香味)

“長安”

外用

益 膚 康 乳 膏

YIHFUKANG Cream “C. A.”

成 份：Each gm Contains：

Clotrimazole10 mg
Betamethasone (as Dipropionate).....0.5 mg
Gentamycin (as sulfate).....1 mg
(potency)

賦 形 劑：

Propylene Glycol, Polyethylene Glycol 6000,
Cetostearyl alcohol, Glyceryl monostearate,
Methylparaben, Butylparaben, Dimethicone, Jasmine Oil.

適 應 症：

治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症。

用法用量：

每日早晚各一次，取適量本品均勻塗於患處及其周圍，治療週期依患處有所不同，如足癬其持續療程須達 2~4 星期。
本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

1. 本品禁用對 Clotrimazole，Betamethasone dipropionate，Gentamycin sulfate 過敏之患者。
2. 本品曾有以下副作用之報告：感覺異常 2%，斑疹，水腫 2 度 感染：0.4%。
3. 本品對於胎兒之安全性尚未確認，故孕婦使用前須衡量本品對於胚胎之影響。
4. 本品含副腎皮脂醇，不可長期或大量用於嬰兒。
5. 雖然尚未證實本品是否會出現乳汁分泌，但授乳期間之婦女仍須謹慎使用。
6. 本品對 12 歲以下兒童不得長期大量使用。
7. 本品僅供外用，不可內服及觸及眼睛。
8. 使用本品應至治療週期屆滿，不得間斷，但治療期間結束後，除非醫師指示亦不得持續使用。
9. 使用本品時有任何不適應即請教醫師。
10. 不可用紗布或其他物品蓋已塗用本品之處處。
11. 本品慎防兒童誤食或誤用。
12. 患者應避免接觸感染源，以防再發。

衛署藥製字第 038984 號

包裝規格：100 公克以下軟管裝

儲存條件：儲存於 25°C 以下

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號

(紫羅蘭香味)

“長安”

外用

益 膚 康 乳 膏

YIHFUKANG Cream “C. A.”

成 份：Each gm Contains：

Clotrimazole10 mg
Betamethasone (as Dipropionate).....0.5 mg
Gentamycin (as sulfate).....1 mg
(potency)

賦 形 劑：

Propylene Glycol, Polyethylene Glycol 6000,
Cetostearyl alcohol, Glyceryl monostearate,
Methylparaben, Butylparaben, Dimethicone, Violet Oil.

適 應 症：

治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症。

用法用量：

每日早晚各一次，取適量本品均勻塗於患處及其周圍，治療週期依患處有所不同，如足癬其持續療程須達 2~4 星期。
本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

1. 本品禁用對 Clotrimazole，Betamethasone dipropionate，Gentamycin sulfate 過敏之患者。
2. 本品曾有以下副作用之報告：感覺異常 2%，斑疹，水腫 2 度 感染：0.4%。
3. 本品對於胎兒之安全性尚未確認，故孕婦使用前須衡量本品對於胚胎之影響。
4. 本品含副腎皮質醇，不可長期或大量用於嬰兒。
5. 雖然尚未證實本品是否會出現乳汁分泌，但授乳期間之婦女仍須謹慎使用。
6. 本品對 12 歲以下兒童不得長期大量使用。
7. 本品僅供外用，不可內服及觸及眼睛。
8. 使用本品應至治療週期屆滿，不得間斷，但治療期間結束後，除非醫師指示亦不得持續使用。
9. 使用本品時有任何不適應即請教醫師。
10. 不可用紗布或其他物品蓋已塗用本品之處處。
11. 本品慎防兒童誤食或誤用。
12. 患者應避免接觸感染源，以防再發。

衛署藥製字第 038984 號

包裝規格：100 公克以下軟管裝

儲存條件：儲存於 25°C 以下

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號

(薰衣草香味)

“長安”

外用

益 膚 康 乳 膏

YIHFUKANG Cream “C. A.”

成 份：Each gm Contains：

Clotrimazole10 mg
Betamethasone (as Dipropionate).....0.5 mg
Gentamycin (as sulfate).....1 mg
(potency)

賦 形 劑：

Propylene Glycol, Polyethylene Glycol 6000,
Cetostearyl alcohol, Glyceryl monostearate,
Methylparaben, Butylparaben, Dimethicone, Lavender Oil.

適 應 症：

治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症。

用法用量：

每日早晚各一次，取適量本品均勻塗於患處及其周圍，治療週期依患處有所不同，如足癬其持續療程須達 2~4 星期。
本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

1. 本品禁用對 Clotrimazole，Betamethasone dipropionate，Gentamycin sulfate 過敏之患者。
2. 本品曾有以下副作用之報告：感覺異常 2%，斑疹，水腫 2 度 感染：0.4%。
3. 本品對於胎兒之安全性尚未確認，故孕婦使用前須衡量本品對於胚胎之影響。
4. 本品含副腎皮質醇，不可長期或大量用於嬰兒。
5. 雖然尚未證實本品是否會出現乳汁分泌，但授乳期間之婦女仍須謹慎使用。
6. 本品對 12 歲以下兒童不得長期大量使用。
7. 本品僅供外用，不可內服及觸及眼睛。
8. 使用本品應至治療週期屆滿，不得間斷，但治療期間結束後，除非醫師指示亦不得持續使用。
9. 使用本品時有任何不適應即請教醫師。
10. 不可用紗布或其他物品蓋已塗用本品之處處。
11. 本品慎防兒童誤食或誤用。
12. 患者應避免接觸感染源，以防再發。

衛署藥製字第 038984 號

包裝規格：100 公克以下軟管裝

儲存條件：儲存於 25°C 以下

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號

(迷迭香香味)

“長安”

外用

益 膚 康 乳 膏

YIHFUKANG Cream “C. A.”

成 份：Each gm Contains：

Clotrimazole10 mg
Betamethasone (as Dipropionate).....0.5 mg
Gentamycin (as sulfate).....1 mg
(potency)

賦 形 劑：

Propylene Glycol, Polyethylene Glycol 6000,
Cetostearyl alcohol, Glyceryl monostearate,
Methylparaben, Butylparaben, Dimethicone, Rosemary Oil.

適 應 症：

治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症。

用法用量：

每日早晚各一次，取適量本品均勻塗於患處及其周圍，治療週期依患處有所不同，如足癬其持續療程須達 2~4 星期。
本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

1. 本品禁用對 Clotrimazole, Betamethasone dipropionate, Gentamycin sulfate 過敏之患者。
2. 本品曾有以下副作用之報告：感覺異常 2%，斑疹，水腫 2 度 感染：0.4%。
3. 本品對於胎兒之安全性尚未確認，故孕婦使用前須衡量本品對於胚胎之影響。
4. 本品含副腎皮質醇，不可長期或大量用於嬰兒。
5. 雖然尚未證實本品是否會出現乳汁分泌，但授乳期間之婦女仍須謹慎使用。
6. 本品對 12 歲以下兒童不得長期大量使用。
7. 本品僅供外用，不可內服及觸及眼睛。
8. 使用本品應至治療週期屆滿，不得間斷，但治療期間結束後，除非醫師指示亦不得持續使用。
9. 使用本品時有任何不適應即請教醫師。
10. 不可用紗布或其他物品蓋已塗用本品之處處。
11. 本品慎防兒童誤食或誤用。
12. 患者應避免接觸感染源，以防再發。

衛署藥製字第 038984 號

包裝規格：100 公克以下軟管裝

儲存條件：儲存於 25°C 以下

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號

(薄荷油香味)

“長安”

外用

益 膚 康 乳 膏

YIHFUKANG Cream “C. A.”

成 份：Each gm Contains：

Clotrimazole10 mg
Betamethasone (as Dipropionate).....0.5 mg
Gentamycin (as sulfate).....1 mg
(potency)

賦 形 劑：

Propylene Glycol, Polyethylene Glycol 6000,
Cetostearyl alcohol, Glyceryl monostearate,
Methylparaben, Butylparaben, Dimethicone, Peppermint Oil.

適 應 症：

治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症。

用法用量：

每日早晚各一次，取適量本品均勻塗於患處及其周圍，治療週期
依患處有所不同，如足癬其持續療程須達 2~4 星期。
本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

1. 本品禁用對 Clotrimazole，Betamethasone dipropionate，Gentamycin sulfate 過敏之患者。
2. 本品曾有以下副作用之報告：感覺異常 2%，斑疹，水腫 2 度 感染：0.4%。
3. 本品對於胎兒之安全性尚未確認，故孕婦使用前須衡量本品對於胚胎之影響。
4. 本品含副腎皮質醇，不可長期或大量用於嬰兒。
5. 雖然尚未證實本品是否會出現乳汁分泌，但授乳期間之婦女仍須謹慎使用。
6. 本品對 12 歲以下兒童不得長期大量使用。
7. 本品僅供外用，不可內服及觸及眼睛。
8. 使用本品應至治療週期屆滿，不得間斷，但治療期間結束後，除非醫師指示亦不得持續使用。
9. 使用本品時有任何不適應即請教醫師。
10. 不可用紗布或其他物品蓋已塗用本品之處處。
11. 本品慎防兒童誤食或誤用。
12. 患者應避免接觸感染源，以防再發。

衛署藥製字第 038984 號

包裝規格：100 公克以下軟管裝

儲存條件：儲存於 25°C 以下

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號

(綜合水果香味)

“長安”

外用

益 膚 康 乳 膏

YIHFUKANG Cream “C. A.”

成 份：Each gm Contains：

Clotrimazole10 mg
Betamethasone (as Dipropionate).....0.5 mg
Gentamycin (as sulfate).....1 mg
(potency)

賦 形 劑：

Propylene Glycol, Polyethylene Glycol 6000,
Cetostearyl alcohol, Glyceryl monostearate,
Methylparaben, Butylparaben, Dimethicone, Tutti Fruit Essence.

適 應 症：

治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症。

用法用量：

每日早晚各一次，取適量本品均勻塗於患處及其周圍，治療週期
依患處有所不同，如足癬其持續療程須達 2~4 星期。
本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

1. 本品禁用對 Clotrimazole，Betamethasone dipropionate，Gentamycin sulfate 過敏之患者。
2. 本品曾有以下副作用之報告：感覺異常 2%，斑疹，水腫 2 度 感染：0.4%。
3. 本品對於胎兒之安全性尚未確認，故孕婦使用前須衡量本品對於胚胎之影響。
4. 本品含副腎皮質醇，不可長期或大量用於嬰兒。
5. 雖然尚未證實本品是否會出現乳汁分泌，但授乳期間之婦女仍須謹慎使用。
6. 本品對 12 歲以下兒童不得長期大量使用。
7. 本品僅供外用，不可內服及觸及眼睛。
8. 使用本品應至治療週期屆滿，不得間斷，但治療期間結束後，除非醫師指示亦不得持續使用。
9. 使用本品時有任何不適應即請教醫師。
10. 不可用紗布或其他物品蓋已塗用本品之處處。
11. 本品慎防兒童誤食或誤用。
12. 患者應避免接觸感染源，以防再發。

衛署藥製字第 038984 號

包裝規格：100 公克以下軟管裝

儲存條件：儲存於 25°C 以下

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號