"羅得" 滅寧消毒水 2%（固魯醛）

Banicide Solution 2%o (Glutaraldehyde)

衛署藥製字第 039000 號 G-4872

「作用」:

1.本品為廣效性之殺菌劑:對 G(＋)，G(－)等一般性增殖性細菌、綠膿桿菌、結核桿菌、細菌芽胞，皆有極佳的殺菌作用。

2.本品具有殺黴菌作用:能消滅 Trichophyton mentagrophytes，及 Candida albicans，Aspergillus fumigatus。

3.本品對 Virus 濾過性病毒具有極佳殺菌效果:使 Polivirus，Herpes Simplex Virus，Rotanirus，Influenza A2 Virus，Newcastle Disease Virus，Feline Virus，Human Immuno Deficiency Virus 等感染率顯著降低。

「成份」:Each ml contains:

Glutaraldehyde Solution (23%)	0.1ml
(eq to Glutaraldehyde	20mg)

「適應症」:

醫療器具之殺菌消毒。

指示用藥。

「用法用量」:

1.將擬消毒之器械先以清水清洗乾淨，俟稍乾後完全浸漬於本品中，置室溫下浸泡，有細孔器其注意使充分接觸本品。

2.浸漬時間:

a.消毒有附著體液之器具(如內科用鏡)，需 1 小時以上。

b.消毒未附著體液之器具，30 分鐘以上。

3.浸漬後戴手套取出器具，再以滅菌水充分沖洗乾淨，有細孔之器具，孔內要注意沖洗。

4.放置於無菌箱備用。

「注意事項」:

1.副作用，與皮膚長時間接觸會發疹，發赤等過敏症

2.使用上注意:

(a)禁止內服。

(b)避免誤飲，保管和取用時要注意。

(c)使用時戴上眼睛等保護具，假如誤入眼睛先用多量的水洗後再由專門醫師治療。

(d)避免接觸呼吸道等粘膜。

(e)取用時應戴橡皮手套。

3.浸泡時:

(a)採用有蓋子的容器。

(b)碳鋼製具浸泡時不可超過 24 小時以上。

(c)使用後瓶子栓緊儲存，保存在 30°C 以下。

(d)遇有冰凍凝結，置放常溫即可溶化。

「包裝」:

4000 公撮以下瓶裝。

羅得化學製藥股份有限公司

臺中縣大甲鎮南北一路 2-13 號