

【有效成分及含量】

Each tablets contains :

ACETYLCYSTEINE66.67 mg

其他成分(賦形劑):

Glucose Anhydrous、Aspartame、Sunset

Yellow FCF Aluminum Lake、Orange

Flavor。

【用途(適應症)】

減少呼吸粘膜分泌的粘稠性

【不得使用族群】

曾因本藥成分引起過敏的人

批 號：

保存期限：



"十全"

痰液溶解劑

速痰顆粒 66.67毫克/公克SUTUN

GRANULES 66.67MG/GM (ACETYLCYSTEINE) "S.C."

十全實業股份有限公司

SHOU CHAN INDUSTRIAL CO,LTD

南投縣南投市南崗工業區仁和路27號

【用法用量】

一天3次。成人每次一包3公克(1包)，

12歲以上，適用成人劑量。

6歲以上未滿12歲適用成人劑量之1/2

3歲以上未滿6歲適用成人劑量之1/4。

3歲以下，請洽醫師診治

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品

衛署藥製字第039057號

G-4915號

【諮詢專線】 (049) 2254615



“十全”**速痰** 痰液溶解劑3公克(200mg)
顆粒 66.67毫克/公克



 **十全實業股份有限公司**
衛署藥製字第039057 G.M.P. G-4915號

MUCOLYTIC AGENT 3GM(200mg)

“S.C.”

SUTUN 66.67MG/GM
Granules

(成份)：每公克中含有：

N-Acetyl-L-Cysteine.....66.67mg

(適應症)：減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性。

(用法、用量)：

一天3次。

成人每次3公克(1包)，12歲以上適用成人劑量：

6歲以上未滿12歲，適用成人劑量之1/2；

3歲以上未滿6歲，適用成人劑量之1/4；

3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治。

醫師藥師藥劑生指示藥品。



醫師藥師藥劑生指示藥品【請詳閱說明書後使用】