

“長安”

四 核 心 乳 膏

外用

Sihexin Cream “C.A.”

成分：每公克中含：

有效成分及含量：Betamethasone(as Valerate).....0.5mg
 Tolnaftate.....10 mg
 Iodochlorhydroxyquin.....10 mg
 Gentamycin(as Sulfate).....1 mg(potency)

其他成分(賦形劑)：Lauryl PEG/PPG-18/18 Methicone, Liquid Paraffin, Cyclopentasiloxane,
 Sodium Chloride, Magnesium Sulfate 7H₂O, Disodium EDTA, Methylparaben,
 Butylparaben, Jasmine Essence, Purified Water.

用途(適應症)：治療皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬(香港腳)、股癬、汗斑、濕疹或皮膚炎。

使用上注意事項：

- 一. 有下列情形者，請勿使用：
 - (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (一) 3歲以下。
 - (二) 有深部皮膚組織感染。
- 三. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - (一) 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (二) 正在接受醫師治療。
 - (三) 患部在臉上。
 - (四) 患部化膿。
- 四. 其他使用上注意事項：
 - (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (二) 避免陽光直射。
 - (三) 勿超過建議使用量或使用次數。
 - (四) 使用部位或其周圍出汗時，請洗乾淨後再用藥。
 - (五) 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
 - (六) 本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)，濕疹，浸潤、潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。
 - (七) 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
 - (八) 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
 - (九) 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
 - (十) 一般黴菌感染療程至少為2週，視感染的程度、部位而定。使用本藥須完成全部療程。
 - (十一) 請勿使用在患部以外，也勿當作預防使用。
 - (十二) 皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。
 - (十三) 小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
 - (十四) 臉部、腋下及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
 - (十五) 癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。

用法用量：將本藥塗擦患處，每天2~3次，如有腳癬須2~3星期的治療。

警 語：

- 一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	過敏性皮膚炎、繼發性感染。 局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。 搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、瘡子、毛細管擴張。
耳朵	聽力出現異常
腎臟	水腫、無尿、尿量減少。
全身性	庫欣氏症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)。繼發性腎上腺功能不足(如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

- 二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 若有上述外之其他不適情況產生。
- (二) 自覺狀況沒有改善或更惡化。
- (三) 一般黴菌治療7天症狀會改善，股癬和體癬為2週，足癬為4週，如經過前述治療時間，症狀若沒有改善，則應停藥立即就醫。如即使若症狀改善停藥後，病情復發亦應立即就醫。

【包裝】100公克以下鉛軟管裝。

【儲存條件】25°C以下避光儲存。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

衛署藥製字第039208號

長安化學工業股份有限公司

彰化縣福興鄉萬豐村福工路19號、19-1號