衛署藥製字第039485號
GMP:G-5078

“內外” 醫普痛 懸液20毫克/毫升

Iputon Suspension 20 mg/mL “N.W.”

本藥須由醫師處方使用

【成分】每mL含
Ibuprofen.....20 mg
【外觀及味道】本品外觀為橘黃色，味道為橘子香味
【藥理作用】
1. Ibuprofen作用機轉：抑制前列腺素(Prostaglandin)之合成而具消炎、鎮痛、解熱之效應。
2. Ibuprofen口服吸收快，約一小時可達最高血中濃度，藥效迅速。
3. Ibuprofen半衰期約2小時，70%經尿液排泄。
4. Ibuprofen為一非比林系，非類固醇(NSAID)之消炎、鎮痛、解熱劑。

【適應症】一般疼痛之緩解及解熱、關節炎輕度疼痛之緩解。
【用法用量】使用前需搖勻。

- 孩童解熱：
  用於6個月到12歲孩童解熱時，若體溫低於102.5°F(約39.2°C)則建議劑量公斤體重0.25 mL；若體溫為102.5°F(約39.2°C)或更高，則建議劑量為每公斤體重0.5 mL。退燒的作用期一般可維持6~8小時。建議之每天最高劑量為每公斤體重2.0 mL。
- 孩童止痛：
  用於6個月到12歲孩童解除輕至中度疼痛時，每6~8小時建議劑量為每公斤體重0.5 mL。建議之每天最高劑量為每公斤體重2.0 mL。給予劑量時不應干擾到孩童的睡眠。
- 幼年性關節炎：
  建議劑量為每天每公斤體重1.5 mL到2.0 mL，分為3到4次服用。若症狀輕微適當劑量為每天每公斤體重1.0 mL。
- 成人止痛：

必要時每4到6小時給予20 mL以解輕度至中度的疼痛。在臨床上的疼痛控制時劑量若高於400 mg時並不會有更佳的效果。

- 原發性經痛：
  若需要時，在疼痛剛開始發生時，每4小時給予20 mL，以減輕疼痛。
  類風濕性關節炎和骨關節炎，包括慢性病的突發症狀。
  建議劑量每天為60~160 mL(15 mL，每天4次；20 mL、30 mL或40 mL，每天3次或4次)。
- 依個別需要：
  Ibuprofen的投與劑量需適合每一位病患，可因症狀的嚴重性或病患對藥物的反應依建議劑量有所增減。

【禁忌症】
1. 消化性潰瘍患者。
2. 重症之血液異常患者。
3. 重症之肝障礙患者。
4. 重症之腎障礙患者。
5. 重症之心機能不全患者。
6. 對本劑過敏之患者。
7. 患有阿斯匹寧(Aspirin)氣喘或曾該病歷之患者。

【對下列患者須慎重投與】
1. 曾有消化性潰瘍病歷之患者。
2. 患有血液異常或曾有此種病歷之患者。
3. 患有肝障害或曾有該病歷之患者。
4. 心機能障害之患者。
5. 曾有過敏症病歷之患者。
6. 支氣管氣喘之患者。

【注意事項】
一般注意事項：
1. 使用消炎鎮痛劑治療乃為對症療法，而非原因療法。
2. 用於治療慢性疾患(慢性風濕性關節炎)時應考慮下列事項：
   - 長期投與時，須定期作臨床檢查(尿液檢查、血液檢查及肝機能檢查)，如發現有異常現象，則須採取減量或停藥等適當措施。
   - 考慮採用非藥物性療法。
3. 用於治療急性疾患時，應考慮下列事項：
   - 對於急性炎症，須考慮其病痛及發熱程度而給藥。
   - 原則上應免長期使用同一類藥品。
   - 如有原因療法，則應採用。
4. 須仔細觀察患者之狀況，留意有否副作用發生。可能出現過度體溫下降、虛脫、四肢冷卻等症狀，對患有高燒之幼兒及高齡或消耗性疾患之患者，給藥後尤須注意觀察患者之狀況。
5. 本藥可能會遮蔽感染症狀之顯現，因此用於治療感染所引起之炎症時，必須合併使用適當之抗菌劑，同時仔細觀察，慎重投與。
6. 儘量避免與其他消炎鎮痛劑合併使用。
7. 對小兒及高齡患者，尤須注意有否副作用出現，並以最低之有效劑量來慎重投與。

【副作用】
1. 血液：可能會引起再生不良性貧血、顆粒性白血球缺乏症、血小板減少等血液障礙，故須做血液檢查並小心觀察，如有異常狀況出現，必須立刻停藥。
2. 過敏症：有時可能會產生Stevens-Johnson症候群(發熱、皮膚黏膜發疹、紅斑、壞死性結膜炎等症候群)、Lyell症候群(中毒性表皮壞死症)、發疹或誘發氣喘等症狀，遇有此等過敏症狀出現時，必須立即停藥。
3. 感覺器官
   - 眼：可能會有視覺異常等症狀出現，若有此症狀出現時，必須立刻停藥。
   - 耳：可能出現重聽及耳鳴等症狀。
4. 肝臟：可能出現黃疸及氨基轉移酶(Transaminase)值異常現象。
5. 消化器官：可能會引起胃腸出血，遇有此等現象，必須立即停藥。有時亦可能會有食慾不振、噁心、嘔吐、胃痛、下痢、胃部不快感等現象，或出現口內炎、便秘等症狀。
6. 精神及神經系統：有時會出現頭痛、暈眩及憂鬱等症狀。
7. 心臟血管系統：有時會出現低血壓等症狀。
8. 其他：可能會出現浮腫。

【孕婦及授乳婦人之投與】
根據動物實驗報告，本藥對動物胎兒具有毒性，對孕婦及授乳婦人之安全性尚未確立，對於孕婦或可能懷孕之婦人及授乳之婦人不要投與。
【酒精警語】
若每天喝三杯或更多的酒精性飲料，請詢問醫師是否能服用Ibuprofen或其他鎮痛解熱劑，因為Ibuprofen可能造成胃出血。

【儲存】請於室溫25°C保存，並放置在孩童無法取得處。
【包裝】15~4000毫升塑膠瓶裝、玻璃瓶裝。

N.W. cGMP 內外化學工業股份有限公司
雲林縣斗六市斗六工業區復興路 3 號