

“華盛頓” 血糖降下劑

G-5098
衛署藥製字第 039546 號固明錠 500 毫克 Glucobin Tablets 500mg “W.P.”
(二甲二脲) (Metformin)

說明：糖尿病 (Diabetes mellitus) 的藥物治療朝向於直接細胞來利用葡萄糖，本劑用於無法以飲食控制的非依賴胰島素之併發型的糖尿病，它能抑制腸道吸收葡萄糖，而增加周圍組織利用葡萄糖，並能抑制肝臟葡萄糖的新生作用，致使血糖低下，為一極佳的血糖降下劑。

成份：Each tablet contains :

Metformin Hydrochloride 500mg

適應症：糖尿病。

用法用量：(1)一日三次，一次一錠，依病情調整劑量。

✓ 每日最高治療劑量為「速效劑型：3000mg；緩釋劑型：2000mg」。

✓ (2)80 歲以上老年病人，不建議開始使用 Metformin 治療。

✓ (3)Metformin 用於治療 80 歲以下之老年患者時，應特別謹慎。

✓ (4)腎絲球體過濾率(eGFR)介於 30-45ml/min/1.73m² 應減量使用。

本藥須由醫師處方使用。



注意事項：

(1)偶有乳酸酸中毒（血中乳酸值上升，葡萄酸值上升，血液 PH 降低等）。

(2)對糖尿病之正確診斷後才用藥，不要以糖尿類似症狀（如腎性糖尿，老人性糖代謝異常，甲狀腺機能異常等）來用藥。

(3)在 Sulfonylamine, Sulfonylurea 係藥劑效果不佳，且有副作用不宜使用時，才考慮使用本品。

(4)初期使用時，應定期檢查其血糖、尿糖來確定其療效。

(5)偶有遷延性之低血糖，所以從事開車者應特別注意。

(6)代謝作用異常現象：乳酸酸中毒，腎機能障礙，肝機能障礙。

(7)偶有貧血、血小板減少症、白血球減少症。

(8)偶有發疹的過敏現象。

(9)長期投與對 Vit.B12 吸收不良。

(10)其他偶有噁心、嘔吐、腹痛、下痢、倦怠感、頭痛、思眠等副作用。

(11)Insulin 製劑，Sulfonylamine 係、Sulfonylurea 係、Guanethidine Aspirin 等水楊酸劑、Propranolol MAO 阻礙劑等會增強本品之降血糖作用。

(12)副腎皮質荷爾蒙、副腎腺素、利尿劑 (Thiazide 系、Chlorthalidone Ethacrynic Acid、Acetazolamide、Triamterene、Furosemide 等) Pyrazinamide、INAH、Phenothiazine 系化合物，本品之降低血糖作用會減弱。

(13)靜脈注射顯影劑有導致急性腎功能下降之危險，因此醫師為病患注射顯影劑應先停用 Metformin，且需確認病患術後之腎功能恢復正常，才能再開始使用該藥品。

(14)醫師為病患處方 Metformin 時，需定期監測其腎功能。

語：Metformin 有導致代謝性酸中毒（例如：乳酸中毒）之風險，醫療人員宜提醒病患該不良反應，倘若出現代謝性酸中毒之不良反應，應立即停藥並回診開立處方之醫師。

禁：腎功能不全患者，腎絲球體過濾率(eGFR)小於 30ml/min/1.73m² 禁用。

包裝：6-1000錠塑膠瓶裝；6-1000錠鋁箔盒裝。

儲存條件：請於室溫(25°C)保存。

華盛頓製藥廠股份有限公司
高雄市仁武工業區工業二路 12 號

電話:07-3711471

