衛署藥製字第039621號
G-4179
Code No.1716

“井田”痛可止® 加強錠

TOZY® Extra Tablets “Chinteng”

本品經臨床證實爲-有效之鎮痛、解熱劑，本劑含咖啡因，口服後可刺激中樞神經，Caffeine與Acetaminophen合併使用，當有效的頭痛緩解劑。

【成　分】：

有效成分及含量：每錠含(Each Tablet contains):

Acetaminophen.....500mg

Caffeine Anhydrous.....65mg

其他成分(賦形劑)：Sodium Starch Glycolate、Povidone、Citric Acid、Stearic Acid、Isopropanol.

【用途(適應症)】：退燒、止痛（緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛）。

【使用上注意事項】：

一、有下列情形者，請勿使用：

(一)曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一)12歲以下。

(二)成人連續服用本藥超過7天，12歲以下小孩超過3天，症狀未緩解的人。

(三)有肝臟疾病的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二)同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

四、其他使用上注意事項：

(一)為防止兒童誤食請妥善保管。

(二)避免陽光直射。

(三)勿超過建議劑使用量。

(四)服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。

(五)酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen（Paracetamol）有急性肝衰竭的風險。

(六)避免再服用含咖啡因藥品、飲品，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】：

成人及12歲以上	發燒或需要時服用，若症狀持續，則每4-6小時可重複服用，每次1錠，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量。每24小時內不可超過4次。

【警　語】：

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一)若有任何不適情況產生。

(二)服用本藥３天後，發燒、疼痛症狀未見改善。

(三)服用過量[每日超過Acetaminophen4,000毫克(mg)]，或服藥後出現下列症狀: 胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。

(四)有過敏情形，例如: 臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包　　裝】：2-1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【類　　別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲　　存】：請置於25℃以下，並避光儲存。

PIC/S G.M.P.

PIC/S G.M.P. &國際ISO 9001認證&中日合作廠

井田國際醫藥廠股份有限公司

CHIN TENG INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURE CORP.

台灣台中市大甲幼獅工業區幼獅路３２號

ＴＥＬ：(04)26814585-7(三線)

諮詢專線：(0800)461461