注　　意｜請詳閱說明書後使用。
儲　　存｜保存於30℃以下，避光、陰涼之處。
製 造 廠｜羅得化學製藥股份有限公司
地　　址｜台中市大甲區東西七路一段65號
代 理 商｜羅得國際有限公司
地　　址｜新北市板橋區干城路158號8樓之1

批　　號:
保存期限:
(月/日/年)

衛署藥製字第039693號
GMP G-5192

4 718882 071242


"羅得"

克炎平凝膠1%

外用

(二克氯吩鈉)

非類固醇消炎止痛劑



40gm

藥物資訊
【有效成分及含量】：每公克中含(Each gm contains)： Diclofenac Diethylammonium.....11.6mg (Eq. to Diclofenac Sodium.....10mg) 其他成分(賦形劑)：Propylene Glycol、Methylparaben、Proprylparaben、Ethanol、Menthol、Peppermint、Triethylamine、Glycerin.
【用途(適應症)】：短期使用以緩解因發炎反應引起之局部疼痛。
【不得使用族群】：(一)曾因本藥成分引起過敏的人。 (二)懷孕期的最後三個月，因可能影響胎兒或增加生產過程之風險。
(三)曾對其他止痛、發燒或發炎藥品有過敏反應者，例如Aspirin(acetylsalicylic acid)、Ibuprofen。這些藥品過敏反應的症狀可能包括：氣喘、呼吸出現哮喘聲或呼吸困難、皮膚紅疹或蕁麻疹、臉或舌頭出現腫脹、流鼻涕。
【用法用量】： 用法：每日使用3-4次　用量：依據疼痛部位的面積大小來決定使用量，每次使用量約2-4克。 依病症與病人反應來決定治療持續的時間。建議要在兩週後檢查療效。
【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品
【諮詢專線】：0800-000-179


"羅得" 克炎平凝膠1% (二克氯吩鈉)

"ROOT"

DICLOFE® Gel 1%

(DICLOFENAC SODIUM)

Nonsteroidal, Anti-inflammatory and Analgesic Agent



For External Use

40gm

"ROOT" DICLOFE® Gel 1% (DICLOFENAC SODIUM)

0 021236 836256