

肩痛・關節痛適用



“得生”

經衛生福利部核定為PIC/S GMP合格藥廠

# 滅痛藥布 Mieh Tong Plaster “T.S.”

清涼感



6枚入

1枚14X10cm

衛署藥製字第039767號 G.M.P. G-5229

請沿此線剪開

6枚入

1枚14X10cm

開封後請輕壓拉鍊，密封保存



“得生” 經衛生福利部核定為PIC/S GMP合格藥廠

# 滅痛藥布 Mieh Tong Plaster “T.S.”

高含水性基劑

## 特點

- “得生”滅痛藥布能快速促進皮膚、筋骨之消炎及鎮痛效果，為一極具清涼感之巴佈劑。
- “得生”滅痛藥布採高含水份基劑，促進有效成份易釋出，經皮膚吸收後，能使患部立即產生冷卻效果，迅速滲透皮下組織深處，促進血液循環，消除患部之疼痛。
- “得生”滅痛藥布呈弱酸性與皮膚相似，故敷貼後吸收迅速，藥效持久，且不易產生過敏現象。本品之通透性佳，對皮膚無刺激性，是一種不會發癢的藥布。

## 成分

有效成分及含量：每16g (10cm×14cm) 中含有：  
Methyl Salicylate ..... 280mg  
L-Menthol ..... 140mg  
DL-Camphor ..... 70mg  
Phellodendron Extract ..... 98mg  
其他成分(賦形劑)：Purified Water, Glycerin, PVA Solution, Sodium Polyacrylate, Sorbitol Solution, Nikasol TS-620, Kadolin, Carboxymethylcellulose Sodium, Sodium Polyacrylate Starch, Tween 80, Nonion OP-80R, Titanium Dioxide, Tartaric Acid, Aerosil 200, Tartrazine

## 不得使用族群

對本藥成分過敏者（包含藥品成分與賦形劑成分）。

## 用法用量

依患部情況給予適當增減使用，次數通常一日1~2次貼於患部，慢性疾患或重症者，可一日換貼2~3次，切割成適當大小，剝去表面薄紙貼於患部。

患部有濕汗或汙垢時會減少膏面之粘著，貼用前請先將患處清洗並拭乾以增強粘著性及藥效。

於關節等易脫落之部位，可用粘著性膠帶或伸縮繩帶固定。

諮詢專線：0800000658

衛署藥製字第039767號 G.M.P G-5229

藥商：得生製藥股份有限公司二廠

地址：臺南市永康區環工路42-1號

製造廠：得生製藥股份有限公司二廠

地址：臺南市永康區環工路42-1號



4 713270 201515

製造批號：

保存期限：

## 用途(適應症)

打撲、扭傷、肩膀痠痛、關節痛、肌肉痛、肌肉疲勞、腰痛、凍傷、骨折痛。

## 使用上注意事項

- 有下列情形者，請勿使用：
  - 對本藥成分過敏者（包含藥品成分與賦形劑成分）。
  - 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師或藥師、藥劑生：
    - 2歲以下兒童。
    - 曾對藥品或化妝品有過敏症狀(皮膚起疹子、紅斑、搔癢等)。
  - 其他使用上注意事項：
    - 兒童(12歲以下)必須在成人的協助下使用。
    - 請勿用於：眼睛四周，有黏膜的地方(如眼睛、生殖道)、出現紅疹或有搔癢的地方、傷口處。
    - 本藥品必須置於兒童(12歲以下)拿不到的地方。
    - 避免陽光直射，保存在室內陰涼乾燥的地方。
    - 為了確保品質，未使用之貼片應置於袋內。

## 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

## 包裝


16.0g (10cm×14cm) /片，1-100片/鋁箔袋裝。

## 儲存條件

儲存於30°C以下。



MADE IN TAIWAN



請由此撕開



拉  
鍊

開封後請速將拉鍊密閉

5 枚入 1枚14X10cm

經衛生福利部核定為PIC/S GMP合格藥廠  
衛署藥製字第039767號  
G.M.P. G-5229

# 外用藥

先生  
女士

用量 1日 回 日分

年 月 日

使用時請詳閱背面說明

5 枚入

1枚14X10cm

“得生” 經衛生福利部核定為PIC/S GMP合格藥廠

# 減痛藥布

Mieh Tong Plaster “T.S.”

高含水性基劑

特  
點

- “得生”減痛藥布能快速促進皮膚、筋骨之消炎及鎮痛效果，為一極具清涼感之巴佈劑。
- “得生”減痛藥布採高含水份基劑，促進有效成份易釋出，經皮膚吸收後，能使患部立即產生冷卻效果，迅速滲透皮下組織深處，促進血液循環，消除患部之疼痛。
- “得生”減痛藥布呈弱酸性與皮膚相似，故敷貼後吸收迅速，藥效持久，且不易產生過敏現象。本品之通透性佳，對皮膚無刺激性，是一種不會發癢的藥布。

## 成分

有效成分及含量：每16g (10cm×14cm) 中含有：  
Methyl Salicylate ..... 280mg  
L-Menthol ..... 140mg  
DL-Camphor ..... 70mg  
Phellodendron Extract ..... 98mg  
其他成分(賦形劑)：Purified Water, Glycerin, PVA Solution, Sodium Polyacrylate, Sorbitol Solution, Nikasol TS-620, Kaolin, Carboxymethylcellulose Sodium, Sodium Polyacrylate Starch, Tween 80, Nonion OP-80, Titanium Dioxide, Tartaric Acid, Aerosil 200, Tartrazine

## 不得使用族群

對本藥成分過敏者（包含藥品成分與賦形劑成分）。

## 用法用量

依患者情況給予適當增減使用，次數通常一日1~2次，貼於患部，慢性疾患或重症者，可一日換貼2~3次，切割成適當大小，剝去表面薄紙貼於患部。

患部有濕汗或汙垢時會減少膏面之粘著，貼用前請先將患處清洗並拭乾以增強粘著性及藥效。

於關節等易脫落之部位，可用粘著性膠帶或伸縮繩帶固定。

諮詢專線：0800000658  
衛署藥製字第039767號 G.M.P G-5229

藥商：得生製藥股份有限公司二廠  
地址：臺南市永康區環工路42-1號  
製造廠：得生製藥股份有限公司二廠  
地址：臺南市永康區環工路42-1號



製造批號：

保存期限：

## 用途(適應症)

打撲、扭傷、肩膀痠痛、關節痛、肌肉痛、肌肉疲勞、腰痛、凍傷、骨折痛。

## 使用上注意事項

- 有下列情形者，請勿使用：
  - 對本藥成分過敏者(包含藥品成分與賦形劑成分)。
  - 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師或藥師、藥劑生：
    - 2歲以下兒童。
    - 曾對藥品或化妝品有過敏症狀(皮膚起疹子、紅斑、搔癢等)。
  - 其他使用上注意事項：
    - 兒童(12歲以下)必須在成人的協助下使用。
    - 請勿用於：眼睛四周，有黏膜的地方(如眼睛、生殖道)、出現紅疹或有搔癢的地方、傷口處。
    - 本藥品必須置於兒童(12歲以下)拿不到的地方。
    - 避免陽光直射，保存在室內乾燥的地方。
    - 為了確保品質，未使用之貼片應置於袋內。

## 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

## 包裝

16.0g (10cm×14cm) /片，1~100片/鋁箔袋裝。

## 儲存條件

儲存於30°C以下。



MADE IN TAIWAN

