鎮暈劑

“正長生”克暈錠 25 毫克

Kerwen Tablets 25mg “J.C.S.”

本品係預防或緩解搭乘交通工具所引起動暈症之內服製劑，如暈車暈船暈機均適用。

〔成分〕Each tablet contains：

Meclizine Hydrochloride 25mg

〔適應症〕預防或緩解動暈症(暈車、暈船、暈機)引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。

〔用法用量〕預防暈車、暈船、暈機時，於搭乘前 30-60 分鐘服 用之。成人 1 次 1 錠，一天服用一次，12 歲以上適用成人劑量；12 歲以下之兒童，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品

注意事項

一、 為防止兒童誤食請妥善保管。
二、 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
三、 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦、可能懷孕婦女及授乳婦不建議自行使用。
四、 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
五、 不得併服含酒精飲料。六、服用本藥若有不了解之處，請洽詢醫師藥師藥劑生。

警語

一、 服用本藥後，可能引起思睡、倦怠感、口乾、偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應(以幼兒及老年人較常見)，老年人應小心使用本藥，如症狀持續加強，宜停藥就醫。
二、 除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得使用。
三、 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：(一)12 歲以下不建議自行使用。(二)曾經因本藥引起過敏症狀者不得使用。
四、 下列病患使用鎮暈藥前，應詢問醫師藥師藥劑生：(一)接受醫師治療並服用藥物者。(二)大於 65 歲以上者。(三)本人或家族具過敏體質者。
五、 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺功能亢進、腎臟病者不得服用。
六、 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用鎮靜劑、安眠劑及其他含有抗組織胺成分之內服製劑(如其他鎮暈藥、綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥等)。
七、 如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難，請勿服用本藥。
八、 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。
九、 如發生皮膚發疹、發紅、癢疹、頭痛、臉紅、心悸、排尿困難、暈眩、浮動、不安定感、口乾、便秘及下痢等症狀時，請停止服用，並持藥品包裝及說明書，詢問醫師藥師藥劑生。

包裝：1000 錠以下玻璃瓶裝　　衛署藥製字第 039957 號 G-5334

貯存：25℃以下 正長生化學製藥股份有限公司

彰化縣和美鎮彰美路二段六號