130.00 mm

150.00 mm

鎮咳祛痰劑

〝晟德〞 **息咳特寧** 糖漿

Secodrine Syrup "Center"

衛署藥製字第 040193 號

主 成 份：每毫升(ml)含有
Codeine Phosphate……0.36 mg
dl-Methylephedrine Hydrochloride……0.75 mg
Chlorpheniramine Maleate……0.1 mg
Guaifenesin……4.0 mg

適 應 症：
鎮咳、祛痰。

用法用量：醫師藥師藥劑生指示藥品
使用前均振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
成人：日服3~4次，每次10毫升。
孩童：日服3~4次，每次5毫升，依年齡酌減。
本品用於兒童，僅限臨床效益大於風險時使用。

禁忌：
兒童扁桃腺及腺樣體切除術後止痛，已知CYP2D6快速藥物代謝者(ultra-rapid metabolisers)及哺乳婦女。

藥理作用：
1.Codeine Phosphate作用於咳嗽中樞，使鎮靜止咳。
2.dl-Methylephedrine Hydrochloride能使氣管炎及支氣管炎有止咳解痙等功能，有支氣管擴張等作用。
3.Chlorpheniramine Maleate：抗過敏製劑。
4.Guaifenesin：祛痰劑。

警 語：
1. 長期使用易致成癮。
2. 本劑含有抗組織胺類成分(Chlorpheniramine Maleate)，應注意以下事項：
(1)服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。
(2)除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患請勿服用本藥：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。
3.本藥含dl-Methylephedrine Hydrochloride 支氣管擴張成分，除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病或高齡者不得服用本藥。

4.曾經因本劑所含藥物引起過敏症狀者不得使用。
5.吸煙、慢性阻塞性肺疾(包括氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽患者請勿自行使用。
6.有高燒、出疹、持續性頭痛、及持續性一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
7.服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀還伴隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。
8.早產兒、1歲以下嬰兒及1-2歲幼兒，不建議使用。
9.2-12歲兒童，依年齡減量使用。
10.肝、腎功能不全者，應小心謹慎減量使用。

賦 形 劑：Citric Acid Anhydrous, Sodium Citrate, Sucrose, Sodium Benzoate, Methylparaben, New Coccine, Sunset Yellow FCF, Orange Essence, Alcohol, Water Purified

包　　裝：10~120毫升塑膠瓶裝。

儲　　存：
(1)本品應置於兒童不及之處。
(2)請密封儲存於25℃以下，毋須冰存並避免陽光直射。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)
CENTER LABORATORIES INC.
地　　址：臺北市南港區園區街3之2號7樓
晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)
廠　　址：新竹縣湖口鄉實踐路2號
公司電話：(02)2655-8680　圖文傳真：(02)2655-8380
工廠電話：(03)598-1829　圖文傳真：(03)598-1820
CTRA-013 20150728　　14S01-D01