
■用法用量
本劑使用患者必須依照血清鈣離子之濃度來調整劑量。
○骨質疏鬆之劑量投與：
建議通常成人1日0.5μg Calcitriol分成2次經口投與，但是可依年齡、症狀之不同作適當之調整。
○其他維生素D代謝異常患者之劑量投與：
通常成人1日1次0.5～2.0μg Calcitriol，經口投與，但是可依年齡、症狀之不同作適當之調整。
本藥須由醫師處方使用
■適應症
佝僂症、軟骨症、維他命D缺乏症、停經後骨質疏鬆症。
■注意事項
請詳閱說明書後使用
■包裝
30粒
井田
優腎骨醇®
軟膠囊
HICALOL Soft Capsules®
0.25微克
活性型D3
促進磷鈣的吸收
(10粒X3)
優腎骨醇® 軟膠囊 0.25微克
井田
■成份每膠囊
(Each Soft Capsule Contains):
Calcitriol(1α,25-Dihydroxycholecalciferol)
.....0.25ug
衛署藥製字第041239號
GMP G-5778
健保代碼：A041239100
4 717216 111227
PIC/S G.M.P.&國際ISO 9001認證&中日合作廠
井田國際醫藥廠股份有限公司
CHIN TENG INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURE CORP.
台灣台中市大甲坊鎮工業區坊鎮路32號
PIC/S G.M.P. TEL:(04)26814585-7(三線)
訂購專線：(0800)461461
"Chinteng"
優腎骨醇®
軟膠囊
HICALOL Soft Capsules®
0.25 μg
活性型D3
促進磷鈣的吸收
(10粒X3)