MDT 1.2
衛署藥製字第041358號PIC/S GMP G-4079
衛部藥廠證字第(AP)0433067號

適用藥害救濟制度

"國嘉" 美得寧錠4毫克（甲基培尼皮質醇）

Medlin Tablets 4mg "KOJAR" (Methylprednisolone)

【成　　份】
Each Tablet Contains：
Methylprednisolone.....4mg

【賦 形 劑】
Lactose、Sodium Starch Glycolate、Talc、Magnesium Stearate、Povidone、Microcrystal Cellulose 101、Brilliant Blue FCF、Sodium Lauryl Sulfate

【適 應 症】
風濕性熱、風濕樣關節炎及過敏性症狀。

【用法用量】
1日4-48mg(1-12錠)，分1-4回服用(增減)。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】
一般注意:
副腎皮質不全、消化性潰瘍、糖尿病、精神障害的治療，有時會出現嚴重的副作用，要特別注意下列事項:
1.要考慮適應症，如用其他方法有效時不使用本劑，如果在局部使用即可，僅在局部使用。
2.連續使用後突然中止使用，會出現發熱、頭痛、食慾不振、脫力感筋肉痛、關節痛、休克等。故最好慢慢減量，如發生離脫症狀時需立即再給予增量。

【禁　　忌】
曾對本劑成分有過敏現象患者。

【對下列患者，原則上不使用本品，在特殊狀況下必需使用時要慎重投與】
1.無有效抗菌劑之感染症。
2.無消化性潰瘍者。
3.精神病患者。
4.結核性疾患之患者。
5.單純疱疹性角膜炎患者。
6.白內障患者。
7.綠內障患者。
8.高血壓患者。
9.有電解質異常的患者。
10.血栓病患者。
11.急性心肌梗塞患者。

【 慎重投與】
1.感染症患者。
2.糖尿病患者。
3.骨疏鬆症患者。
4.腎不全患者。
5.有甲狀腺機能低下患者。
6.肝硬變患者。
7.脂肪肝患者。
8.脂肪塞栓患者。
9.重症肌無力症患者。

【 副 作 用 】
1.感染症:誘發性感染症、感染更加惡化。
2.內分泌系:續發性副腎皮質機能不全、糖尿病、月經異常等現象。

3.消化器:消化性潰瘍、膵炎、下痢、嘔心、嘔吐、胃痛、口渇、食慾不振、食慾高進等現象出現。
4.精神神經系:精神變調、憂鬱、不眠、頭痛、眩暈、痙攣等現象出現。
5.筋、骨骼、骨疏鬆症、大腿骨及上腕骨等骨頭無菌性壞死、筋肉痛、關節痛等。
6.脂質、蛋白代謝、滿月樣顏貌、野牛肩、氮素負平衡、脂肪肝等現象出現。
7.體液、電解質:浮腫、血壓上昇、低鉀性Alkalosis。
8.眼:連續使用眼壓高進，定期實施眼壓檢查:白內障、綠內障、眼球突出等現象。
9.血液:白血球增多、血栓症等。
10.皮膚:多毛、痤瘡、脫毛、色素沈著皮下溢血、紫斑、線條、瘙癢、發汗異常、顏面紅斑、創傷治療、障害、皮膚菲薄化、脆弱化、脂肪織炎。
11.過敏症:過敏時停用。
12.其他發熱疲勞感Sterold腎症、體重增加、精子數及運動性減低。

【妊婦、授乳婦之投與】
1.應慎重投與，有益比危害高時方可使用。
2.授乳婦避免投與。

【小兒投與】
1.對小兒發育抑制，應小心觀察。
2.長期投與頭蓋內壓高進。

【相互作用】
1.Barbital，Phenytoine，Rifampicine併用促進代謝，本劑作用減弱。
2.水楊酸及其誘導體併用時應減少本劑量。
3.對抗凝血、口服糖尿病藥之作用會被減弱。
4.利尿劑(除會保持鉀鹽利尿劑外)併用會產生低血鉀症。

【其　　他】
副腎皮質荷爾蒙劑投與中的患者，疫苗、接種產生神經障害，抗體反應消失。

【包　　裝】
2-1000錠罐、鋁箔盒裝。

【儲　　存】
室溫避光保存(25°C)。

PIC/S GMP
國嘉製藥工業股份有限公司 幼獅三廠
KOJAR PHARMA TAICHUNG YOUTH PLANT 3
臺中市大甲區日南里工十路2號
服務專線：(04)26816197