

愛斯百朗-樂液

S.S. BRON-L SOLUTION

愛斯百朗-樂液

- 咳嗽是咽喉與支氣管所引起的一種惱人症狀，長時間的咳嗽會引起肺與心臟的負擔，並且會令人難以入睡，消耗體力。
- 愛斯百朗-樂液，能抑制咳嗽，促進痰的排出。
- 愛斯百朗-樂液，有味道香甜的巧克力口味。

成份

每1ml中含有：

Dextromethorphan Hydrobromide monohydrate	2mg
Guaifenesin.....	5.67mg
DL-Chlorpheniramine Maleate.....	0.4mg
Caffeine Anhydrous.....	2.067mg

賦形劑：Sucrose、Sodium Chloride、Citric acid、Sodium Benzoate、Butyl P-Hydroxybenzoate、Caramel、Chocolate Essence ST-70A、Ethanol、L-Menthol、Purified Water.

成份與作用

成 份	作 用
Dextromethorphan Hydrobromide monohydrate	非麻醉性鎮嗽劑
Guaifenesin	加強氣管黏膜分泌機能，促進痰的排出
DL-Chlorpheniramine Maleate	對過敏性咳嗽有效
Caffeine Anhydrous	作用於大腦皮質，防止思睡

適應症

鎮咳、祛痰

用法・用量

年 齡	15歲以上成人	11~15歲	7~11歲	3~7歲
一次量	5ml	3ml	2.5ml	2ml

*一日四次，飯前服用。

*醫師、藥師、藥劑生指示藥品

注意事項

1. 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，必須停藥立即就醫。
2. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，含咖啡因之本類製劑，12歲以下不得使用。
3. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，曾經因藥物引起過敏症狀者不得使用。
4. 若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子、或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
5. 吸煙、慢性阻塞性肺疾，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽，請勿自行使用本類藥品。
6. 服用含抗組織胺之本類藥品後，駕車或操作危險器械時要小心。
7. 除非有藥師、藥劑生或醫生指示，下列病患勿服用含抗組織胺之本類藥品：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。
8. 不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
9. 不要服用本類藥物超過七天。
10. 服用本類藥品後，如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三天，應停藥立即就醫。
11. 服用本類藥品後，如果喉嚨疼痛持續二天以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
12. 服用本類製劑應限制再服用含咖啡因藥品、飲料（如：茶、咖啡、可樂等），過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。

**警語：**

1. 吸煙、慢性阻塞性肺疾（Chronic Obstructive Pulmonary Disease）包括氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽患者請勿自行使用。
2. 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
3. 祛痰劑宜空腹服用。

包 裝

5~60ml 玻璃瓶裝、塑膠瓶裝

工ス工ス製薬株式会社
商標授權井田國際醫藥廠股份有限公司 製造
CHIN TENG INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURE CORP.
台中市大甲區幼獅路 32 號