

## PONTEX TABLETS “HOCHENG”

**【成分】：**每錠中含有：

Acetylsalicylic acid-----325.0mg

Caffeine anhydrous-----18.0mg

**【適應症】：**

退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

**【用法用量】：**

發燒或需要時服用，飯後半小時內服用為宜，若症狀持續，則每4~6小時可重複服用，每24小時內不可超過4次。成人每次1錠，12歲以上適用成人劑量。

醫師藥師藥劑生指示藥品

**【注意事項】**

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四、勿超過建議劑量，若有不適情況發生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 五、不得併服含酒精飲料。

**【警語】**

- 一、服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴等症狀時，應停藥並就醫。
- 二、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
  - (一)12歲以下不建議自行使用。
  - (二)曾經因藥物引起過敏症狀者不得使用。
- 三、服用本類製劑三天後，發燒、疼痛症狀未見改善，應停藥就醫。
- 四、成人不得連續服用本類製劑超過7天，小孩不得超過3天，視情形需要，繼續服用本類製劑前，請洽醫師。
- 五、本藥含 Acetylsalicylic acid，應注意下列事項：
  - 1.懷孕第1、2期婦女：除非醫師藥師藥劑生指示，不得自行使用。  
懷孕第3期婦女：不得使用。
  - 2.不得併服含酒精飲料，因可能造成胃出血。
  - 3.本藥不得使用於12歲以下兒童，亦不得使用於18歲以下兒童及青少年之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能與一種罕見而嚴重之疾病-雷氏症候群（Reye's Syndrome）有相關性。
  - 4.蠶豆症（6-磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏症，Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency）患者，不得服用本藥。
  - 5.曾有消化性潰瘍或使用抗凝血劑之患者，不得服用本藥。
  - 6.可能引起胃腸不適、胃腸出血、皮膚出疹、出血傾向、氣喘、耳鳴等不適症狀。
- 六、本藥含咖啡因類成分，應限制再服用咖啡因藥品、飲料(如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。

**【包裝】：**2~1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

**【儲存溫度】：**室溫(15~30°C)。

**委託者：**合成藥品股份有限公司

高雄市新興區洛陽街 11 號 5 樓之 6 TEL：07-2371605

**製造廠：**臺灣派頓化學製藥股份有限公司

高雄市岡山區爲隨東路 50 號