【用法用量】

成人	一次2錠	一日3次，飯後服用
7-14歲	一次1錠	
4-6歲	一次1/2錠	

【警　語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化系統	噁心、嘔吐、食慾不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一) 若有任何不適情況產生。

(二) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、濃痰、疹子或持續性頭痛

(三) 症狀沒有改善，或症狀還併隨有發燒或發燒持續三日。

(四) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。

(五) 服用過量【Acetaminophen每日超過4,000毫克(mg)】，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。

(六) 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【作　用】

- 解熱鎮痛之成分：Acetaminophen、Ethoxybenzamide。
- 抑制咳嗽之成分：dl-Methylephedrine HCl、Noscapine。
- 消除噴嚏、流鼻水、鼻塞、喉癢等不快感之成分：Chlorpheniramine Maleate。

【類　別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【包　裝】12-1000錠盒裝。

【儲　存】儲存於25℃以下。

衛署藥製字第041687號

新萬仁化學製藥股份有限公司
Hsin Wan Jen Chem.&Pharm.Co.,Ltd.
台中市豐原區文賢街158號